

سالبوتامول

شربت سالبوتامول

موارد و مقدار مصرف:

دسته دارویی: گشاد کننده برونش

درمان برونکواسپاسم:

کودکان ۶-۲ سال: ۵/۵-۵/۲۵ میلی لیتر هر ۶-۸ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۴ میلی گرم.

کودکان ۱۴-۶ سال: ۵ میلی لیتر هر ۶-۸ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۲۴ میلی گرم. کودکان بالای ۱۴ سال و بزرگسالان: ۴-۲ میلی گرم هر ۶-۸ ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: ۳۲ میلی گرم.

موارد منع مصرف:

حساسیت به سالبوتامول یا هر یک از اجزای دارو.

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری با احتیاط مصرف شود. در دوران شیردهی بهتر است از فرم استنشاقی سالبوتامول استفاده شود.

هشدارها:

در کودکان زیر ۲ سال با احتیاط مصرف شود.

احتیاط های مصرف:

در بیماران قلبی با احتیاط مصرف شود. برای کاهش عوارض گوارشی، بهتر است دارو همراه با غذا مصرف شود.

تداخل های دارویی:

آمی تریپتیلین، کلومیپرامین، دزپیرامین، دوکسین، ایمپیرامین، ایزوکربوکسازید، لینزولید، ماپروتیلین، نورتریپتیلین، فنلژین، ترانیل سیپرومین، ترازودون.

عوارض جانبی:

اسیدوز لاکتیک (با دوزهای بالا)، تهوع، لرزش بدن، تحریک عصبی در کودکان ۶-۲ سال، تب، استفراغ، سردرد، سرگیجه، سرفه.

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

اسفند ۱۳۹۷

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲