

موکوران[®] اکسیکتوران

هر ۵ میلی لیتر شربت حاوی ۱۰۰ میلی گرم گایافنزین، ۳۰ میلی گرم سودوافدرین هیدروکلراید و ۲ میلی گرم کلرفنیر آمین مالئات می باشد.

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

در صورت وجود مشکلات زیر با پزشک مشورت نمایید.
- در صورت بارداری، شیردهی یا اگر قصد بارداری دارید.
- بی نظمی ضربان قلب

- بی نظمی غدد فوق کلیوی، بیماریهای قلبی و عروقی، فشار خون بالا، دیابت، سکتة مغزی، گلوکوم، انسداد مثانه، معده و روده، زخم معده، مشکلات ادراری، بیماریهای مربوط به پروستات، صرع، پرکاری تیروئید.
- در صورت عدم بهبود علائم بیماری یا بدتر شدن آنها، با پزشک مشورت کنید.

- این دارو ممکن است روی سطح هوشیاری یا عکس العمل شما تاثیر بگذارد، لذا هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارد مراقب باشید.
- از مصرف همزمان سایر داروهای حاوی این اجزا بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.

- از تغییر دوز و یا مصرف طولانی تر دارو بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.

- اگر علائم بیماری بین ۷-۵ روز پس از مصرف دارو بهبود نیافت، با پزشک مشورت کنید.

- در صورت لزوم انجام تستهای آلرژی پوستی از مصرف این دارو خودداری کنید.

- در صورت لزوم انجام عمل جراحی و دندان پزشکی پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع کنید.

- در افراد مسن و کودکان با احتیاط مصرف شود.
- برای درمان سرفه های مزمن ناشی از سیگار کشیدن، آسم و بروشیت مزمن استفاده نشود.

موارد مصرف:

کلرفنیر آمینال / گایافنزین / سودوافدرین هیدروکلراید یک ترکیب ضد احتقان، ضد سرفه و خلط آور است که برای درمان نشانه ها و علائم گرفتگی سینوس ها، آبریزش بینی، عطسه، خارش و سوزش گلو ناشی از سرماخوردگی، عفونتهای دستگاه تنفسی بکار می رود.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به هر یک از اجزای دارو
- فشار خون بالا، بیماریهای قلبی و عروقی
- مشکلات ادراری و یا حملات آسم
- در صورت مصرف سدیم اکسیبات، فورازولیدون، مهارکننده های

مونوآمین اکسیداز (MAO) مانند فنلزین، در ۱۴ روز قبل از مصرف این دارو

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- با نظر پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود. گرچه معمولاً همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از آن ها با پزشک مشورت نمایید.

یوست، اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، تهیج، سردرد، کاهش اشتها، استفراغ، ضعف اعصاب و یا اضطراب،

بی خوابی، دل پیچه، تهوع، کسالت و سستی، مشکلات بینایی، علائم حساسیت شدید شامل (خارش و جوش پوستی، کهیر، مشکلات تنفسی، تنگی قفسه سینه، تورم دهان، صورت، لبها و یا زبان) مشکلات ادراری، بی نظمی ضربان قلب

تداخلات دارویی:

- مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) مانند فنلزین

- ضد افسردگی ها مانند آمی تریپتیلین

- برومکریپتین، سدیم اکسیبات، متیل دوبا

- فورازولیدون

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی با نظر پزشک مصرف شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد دور از نور نگهداری و از بیخ زدگی محافظت نمایید.

- از مصرف دارو های تاریخ مصرف گذشته خودداری کنید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: مهر ۱۴۰۲