

Rhinoriz®

NASAL Spray

Soluride®

Sodium chloride 0.65%

رینوریز®

اسپری بینی

سولوراید®

سدیم کلراید ۰/۶۵ درصد

و نکو ماسین عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایند: سوزش خفیف در بینی، واکنش حساسیتی جدی (از جمله: بیثورات، خارش / تورم، سرگیجه شدید، مشکل در تنفس).

شرایط نگهداری:

دارو، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

ساخت شرکت داروسازی

خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:

دی ۱۳۹۸

پس از هر بار مصرف نازل را تمیز نموده و در پوش ظرف را در جای خود قرار دهید.

موارد منع مصرف:

- در صورت وجود سابقه حساسیت به فراورده و یا به هر یک از مواد تشکیل دهنده آن.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو پس از مشورت با پزشک می تواند در دوران بارداری / شیردهی استفاده شود.

هشدارها:

فراورده را از طریق دهان استفاده ننمایید بلکه فقط در بینی خود استفاده کنید. از مصرف دهانی و یا چشمی خودداری کنید (ممکن است ایجاد سوزش نماید)

موارد احتیاط:

- سعی کنید نوک ظرف را به قسمت داخلی بینی خود نزدیک. در صورت بروز چنین اتفاقی، نوک اسپری را با آب داغ بشویید و قبل از اینکه ظرف را بپیچید، با یک دستمال تمیز خشک کنید.

- اگر وضعیت شما تداوم یافت یا بدتر شد، یا اگر فکر می کنید ممکن است مشکل پزشکی جدی داشته باشید، فوراً به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.

- اگر از سایر محصولات بینی استفاده می کنید، قبل از شروع مصرف به پزشک اطلاع دهید.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید:

دیسیکلو مین، سیکلوفنولات، سفپی،

هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی ۰/۶۵ گرم سدیم کلراید می باشد. و در هر جعبه یک بطری ۲۰ میلی لیتری به همراه یک بروشور توسط شرکت داروسازی خوارزمی تهیه و توزیع می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- * وجود هر گونه حساسیت
 - * بارداری و یا شیردهی
 - * استفاده از سایر داروها
 - * ابتلا به بیماری های دیگر
 - * اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب
- موارد و مقدار مصرف دارو:

این محصول برای درمان خشکی داخل بینی (مجاری بینی) استفاده می شود. به افزایش رطوبت داخل بینی کمک کرده و مخاط ضخیم یا خشک شده را نرم و قابل حل مینماید مقدار مصرف هر فراورده را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول آن به شرح ذیل است:

مقدار مصرف عمومی:

- * احتقان بینی:
- بزرگسالان: یک الی دو اسپری در هر سوراخ بینی هر ۴ ساعت.
- اطفال بالای دوسال: یک اسپری در هر سوراخ بینی هر ۴ ساعت.

نحوه مصرف:

- از قطع یا تغییر در میزان مصرف و نحوه مصرف دارو بدون اطلاع پزشک معالج خودداری نمایید.

- قبل از مصرف بینی خود را خالی کنید.

- سر را به حالت راست نگه داشته و با فشاری محکم و کوتاه محلول را در هر سوراخ بینی اسپری کنید. (عمیقاً) استنشاق نمایید.

شرکت داروسازی
خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال
پن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۷۱۶۵۱۲ تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۱۴۱۲-۱۷
info@kharazmipham.com www.kharazmipham.com