

F.C. Tablet Sumatriptan 85 / Naproxen 500

قرص روکشدار سوماتریتان ۸۵/ناپروکسن ۵۰۰

بازیلار
-بیماری عروق محیطی
-بیماری ایسکمیک روده
-فشار خون بالای کنترل نشده
-استفاده از داروهای ارگوٹ مانند دی هیدرو ارگوٹامین طی ۲۴ ساعت گذشته

-استفاده همزمان یا اخیر (طی ۲ هفته گذشته) از مهار کننده مونوآمین اکسیداز-A

-سابقه بروز واکنش های حساسیتی شدید از جمله کهیر، برونکواسپاسم و رینیت بعد از مصرف اسپرین و یا سایر ضد التهابی غیر استروئیدی

-سابقه آلرژی به سوماتریتان یا ناپروکسن

-اختلال شدید کبدی

-ابتلا به زخم گوارشی فعال

مصرف در بارداری و شیردهی:

-مصرف این دارو در سه ماهه سوم بارداری ممنوع می باشد. جهت استفاده از دارو در سایر ماه های بارداری با پزشک معالج خود مشورت نمایند.

-مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

موارد احتیاط:

-در صورت وجود هر یک از موارد زیر پزشک خود را مطلع سازید:

-سابقه ابتلا به زخم های گوارشی

-در صورت بروز علائم سمیت کبدی مانند تهوع و استفراغ، اسهال، خارش، ادرار تیره رنگ، درد در ناحیه بالای شکم، زرد شدن رنگ پوست و قرنی چشم

-در صورت بروز علائم سندرم سروتونینی مانند افزایش ضربان قلب، بی قراری و گیجی، تعریق، لرزش یا تب

-در صورت بروز علائم اختلالات کلیوی مانند کاهش یا توقف ادرار، تورم در پاها، تنگی نفس

-در صورت بروز علائم واکنش های حساسیتی شدید از جمله راش پوستی، کهیر، تورم لب ها و زبان، اختلال در تنفس،

-در صورت وجود حساسیت به داروهایی نظیر اسپرین، ایبوپروفن، سلکوکسیب، ایندومتاسین و سایر داروهای ضد التهابی

غیر استروئیدی

هر عدد قرص خوراکی روکشدار ناپروکسن/سوماتریتان حاوی ۵۰۰ میلی گرم ماده موثره ناپروکسن- سدیم و ۸۵ میلی گرم ماده موثره سوماتریتان بصورت سوکسینات می باشد که در جعبه های حاوی یک بلیسستر ۱۰ عددی، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود:

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع رسانی نمایید.

*وجود هرگونه حساسیت به دارو *بارداری و یا شیردهی

*استفاده از سایر داروها *ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو:

قرص ناپروکسن/سوماتریتان جهت درمان میگرن حاد یا بدون علائم آنورا تجویز می شود. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان و سایر داروهای که مصرف می نمایید، تعیین می شود. اما مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان: ۱ عدد قرص در روز، اگر پس از مصرف اولین دوز علائم شما فقط تا حدودی تسکین یافت، یا اگر سردرد شما بازگشت، با گذشت حداقل دو ساعت، میتوانید یک قرص دیگر مصرف کنید.

نحوه مصرف:

-به محض شروع علائم سردرد میگرنی دارو را استفاده کنید.

قرص را به همراه یک لیوان آب مصرف و از شکستن و یا نصف کردن آن خودداری نمایید.

-به منظور کاهش علائم گوارشی بهتر است دارو را همراه با غذا و یا بعد از آن مصرف کنید.

-این دارو را حداکثر برای ۵ اپیزود سردرد در یک ماه استفاده نمایید.

موارد منع مصرف:

-سابقه بیماری عروق کرونر (از جمله ایسکمی میوکارد و آنژین صدری)

-سابقه جراحی بای پس عروق قلبی

-سندرم ولف - پارکینسون وایت یا سایر اختلالات ریتم و مسیر هدایت قلبی

-سابقه سکتة مغزی، حمله ایسکمیک گذرا یا میگرن همی پلژیک یا

در صورت سابقه تشنج، ابتلا به صرع و مواردی که منجر به کاهش آستانه تشنج می شوند.

این دارو ممکن است موجب خواب آلودگی گردد، در این صورت از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید. در طول درمان با این دارو از مصرف فرآورده های حاوی الکل خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) تهیه نمایید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع یا متوقف نکنید و از تغییر میزان مصرف آنها خودداری کنید.

داروهای ضد انعقاد خون نظیر آسپرین و وارفارین
داروهای ضد افسردگی مانند سیتالوپرام، فلوکستین، فلووکسامین، پاروکستین، سرتالین، ترازدون، سلژیلین، ترانیل سیپرومین، ایزوکربوکسازید

دیگوکسین
داروهای حاوی الکلویید های ارگوت مانند متی سکرژید و دی هیدروارگوتامین

داروهای مدر مانند فوروزماید و هیدروکلروتیازید
متوترکسات

سیکلوپورین
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن، ایندومتاسین و آسپرین
لیتیم

عوارض جانبی دارو:

عوارضی که در صورت بروز نیازمند مراقبت سریع پزشکی می باشد، عبارتند از:

تنگی نفس، درد قفسه سینه، تورم در ناحیه صورت و گردن، بروز اشکال در تکلم، احساس ضعف در یک ناحیه یا یک سمت از بدن
در صورت بروز عوارض زیر دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع

دهید:

درد شدید شکمی، استفراغ خونی، مدفوع تیره رنگ، تب به همراه راش های پوستی، پوست زرد رنگ، افزایش وزن غیر طبیعی
سایر عوارض این دارو عبارتند از:
سوزش معده، اسهال، یبوست، تهوع، استفراغ، سرگیجه، گیجی و خواب آلودگی، احساس ضعف و خستگی

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هیچ فرآورده ای دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: اردیبهشت ۱۴۰۳