

کیسول سونیسر[®] با دوزهای ۲۵ یا ۵۰ میلی گرم های ماده مؤثره سونیتینیب مالات می باشد، که توسط شرکت داروسازی خوارزمی در جبهه های ۲۸ عددی تولید و به بازار عرضه میشود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو، متن راهنما را به طور کامل مطالعه کنید و آن را نزد خود نگه دارید زیرا حاوی اطلاعات مهمی در مورد این دارو می باشد.

در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی می توانید با پزشک خود مشورت نمایید این می تواند شامل هر گونه عارضه جانبی باشد که در این پرورشور نیامده است.

در صورت داشتن سوالات بیشتر می توانید از پزشک یا داروساز خود سوال نمایید.

دسته دارویی:

آنتی تئوپلاستیک (ضد سرطان)

مکانیسم اثر:

سونیتینیب مهار کننده آنزیم تروپتین کیناز می باشد و از این طریق موجب اختلال در روند رشد و گسترش سلول های سرطانی در بدن می شود.

موارد مصرف:

تومور استرومال دستگاه گوارش (GIST)

نوعی از سرطان معده و روده است و در مواردی که داروی ایماتینیب (نوعی داروی ضد سرطان) دیگر پاسخ گو نمی باشد و یا بیمار قادر به مصرف ایماتینیب نیست، کاربرد دارد.

کارسینوما متاستاتیک سلول های پرکاری تیروئید (MRCC)

سرطان کلیوی می باشد که در سایر قسمت های بدن نیز گسترش یافته است.

تومور های نوئو اندوکراین پیشرفته پانکراس (pNET)

تومور های سلول های تولید کننده هورمون در پانکراس می باشد که پیشرفته شده اند و می توانی این تومور ها را با جراحی برداشت.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو با پزشک با توجه به شرایط بیماری و بیمار معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

در بیماران مبتلا به تومور استرومال دستگاه گوارش:

دوز معمول به صورت ۵۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۲۸ روز و سپس ۱۴ روز دوره بدون دارویی (یک سیکل کامل درمانی) می باشد. دوره درمان تا زمان پیشرفت بیماری و یا بروز سمیت غیر قابل قبول ادامه می یابد.

در بیماران مبتلا به تومور های نوئو اندوکراین پیشرفته پانکراس:

دوز معمول مصرف دارو به صورت ۳۷۵ میلی گرم یک بار در روز می باشد. دوره درمان تا زمان پیشرفت بیماری و یا بروز سمیت غیر قابل قبول ادامه می یابد.

کارسینوما متاستاتیک سلول های پرکاری تیروئید (در بزرگسالانی که در ریسک بالا عود مجدد بیماری می باشند):

دوز معمول به صورت ۵۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۲۸ روز و سپس ۱۴ روز دوره بدون دارویی (یک سیکل کامل درمانی) می باشد. دوره درمان تا زمان پیشرفت بیماری و یا بروز سمیت غیر قابل قبول ادامه می یابد.

نحوه مصرف:

کیسول سونیسر[®] را می توانید همراه غذا یا بدون آن مصرف کنید.

کیسول سونیسر[®] را به همراه یک لیوان پر از آب میل نمایید.

از مصرف گریپ فروت و یا فرآورده های حاوی این میوه با کیسول سونیسر[®] خودداری کنید.

در صورتی که از چگونگی مصرف دارو مطمئن نیستید با پزشک خود تماس حاصل فرمایند.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود حساسیت به سونیسر[®]

هشدار ها:

دوره مصرف دارو را بر طبق نظر پزشک ادامه دهید و دارو را خودسرانه قطع نکنید.

سونیتینیب تأثیر جزئی بر توانایی رانندگی و کار یا ماشین آلات دارد و به بیماران باید توصیه شود که ممکن است در طول درمان با سونیتینیب دچار سر گیجه شوند.

احتیاطات داخل کیسول نباید با سطح تماس پیدا کنند، در صورتی که در اثر باز شدن یا شکستن کیسول محتویات با پوست تماس پیدا کرد سریعاً محل تماس را با صابون و آب کافی بشویید.

مصرف این دارو در افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی گردد.

در صورتی که بر باردار حسیتید و یا قصد باردار شدن دارید، درمورد مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مطابق دستورالعمل داروهای سایتوتوکسیک حمل، نگهداری و مصرف شود.

این دارو ممکن است باعث تغییر رنگ ادرار شود که می ضرر است.

احتیاطات مصرف:

در صورت وجود موارد زیر، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید:

– در صورت داشتن فشار خون بالا:

این دارو می تواند موجب افزایش فشار خون گردد. پزشک در طول مدت درمان با این دارو فشار خون بیمار را ارزیابی می کند و در صورت نیاز دارو های کاهنده فشار خون را به درمان اضافه می نماید.

– در صورتی که هم اکنون و یا در گذشته مبتلا به بیماری های خونی و یا اختلالات خونریزی بوده اید:

این دارو با سونیتینیب می تواند موجب افزایش ریسک خون ریزی گردد. این دارو می تواند باعث تغییر در تعداد پلاکت ها و گلبول های خونی شود و به دنبال آن مشکلاتی نظیر آنمی (کم خونی) و یا بوز مشکلات انعقادی را باعث شود.

در بیماران مصرف کننده دارو های رقیق کننده خون می جمله وارفارین، توصیه می شود قبل از شروع درمان با دارویی سونیتینیب حتماً پزشک خود را مطلع سازند. هم چنین در صورت بروز خونریزی و یا کبودی در طول مدت درمان به پزشک خود اطلاع دهند.

– در صورت داشتن مشکلات قلبی:

در صورت بروز علائمی مانند: احساس خستگی، تنگی نفس و یا تورم پا، در طی درمان با این دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت بروز تغییرات غیر طبیعی در رنتم قلبی:

سونیسر[®] می تواند موجب بروز رنتم غیر طبیعی در قلب گردد. پزشک ممکن است الکترو کاردیوگرام قلبی را برای بیمار جهت ارزیابی مشکلات ریتمیک قلب در طی درمان با این دارو تجویز نماید. در صورت بروز علائمی مانند: سر گیجه، از هوش رفتن و یا ضعیف شدن قلب طبیعی در طی درمان با این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت داشتن سابقه بیماری های مرتبط با بروز ترومبوز در عروق داخل سکنه، جمله قلبی، آمبولی و ترومبوز، به پزشک خود اطلاع دهید. در صورت بروز علائمی من جمله: درد یا فشار بر روی قفسه سینه، درد در دست، گردن و کف، تنگی نفس، بی حسی و ضعف در یک قسمت از بدن، سردرد، سر گیجه و مشکل در تکلم سریعاً به پزشک اطلاع دهید.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات گوارشی:

سونیسر[®] می تواند باعث اختلال در عملکرد دستگاه گوارش شود. در صورت بروز علائمی مانند: تهوع، استفراغ و یا یبوست، با پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات کلیه و یا ابتلا به این مشکلات در حال حاضر:

در صورت بروز علائمی مانند: خارش، زردی پوست و یا چشم، تیرگی ادرار، درد در ناحیه قفسه راست و قوفانی شکم در طی درمان با این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات کبدی و یا ابتلا به این مشکلات در حال حاضر:

در صورت بروز علائمی مانند: خارش، زردی پوست و یا چشم، تیرگی ادرار، درد در ناحیه قفسه راست و قوفانی شکم در طی درمان با این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورت داشتن سابقه یا بروز عارضه آنوریزم (بزرگ شدن و ضعیف شدن دیواره عروق) و یا پارگی دیواره عروق، پزشک را مطلع سازید.

– در صورت داشتن یبوست:

افراد یبانی در طول مصرف این دارو باید به طور منظم سطح قند خون را بسنجند تا از ریسک کاهش قند خون همراه با این دارو بکاهند. علائم هایوگیسمی (کاهش قند خون) مانند: افزایش احساس گرسنگی، تعریق، کاهش سطح هوشیاری، خستگی، و تپش قلب همراه با این دارو دیده شده است. در صورت بروز این مشکل پزشک باید دوز دارو های کاهنده قند خون بیمار را تنظیم نماید.

– در صورت داشتن سابقه تشنج:

در صورت بروز علائمی مانند: فشار خون بالا، سردرد و کاهش دید پزشک را سریعاً مطلع سازید.

– در صورت داشتن بیماری های پوستی:

Pyoderma gangrenosum (زخم های در دناک پوستی) و یا **Necrotizing Fasciitis** (گسترش سریع عفونت در پوست و با یافت های نرم که ممکن است تهدید کننده حیات باشند، همراه با این دارو دیده شده است. در صورت بروز علائمی چون: بروز عفونت اطراف زخم های پوستی، تب، درد، قرمزی و تورم، زه کشی خون و چرک در ناحیه زخم، سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.

هم چنین راش های پوستی من جمله (سندروم استوین جانسون، اریتما مولتی فرم و نکروز سمی ایپیرم) همراه با مصرف این دارو دیده شده است. در صورت مبتلا شدن به راش و یا علائم پوستی سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.

این بیماری های پوستی به صورت لکه های قرمز و یا تکه های ادره ای شکل می باشند که غالباً با ناول های مرکزی بر روی تورخ در نازمان می دهند. این راش ها ممکن است پیشرفت کرده و به صورت ناول و پوسته گسترش یابد.

– قبل از شروع مصرف سونیتینیب حتماً چک آپ دندان پزشکی توصیه می گردد. اگر تحت درمان دندان پزشکی و یا جراحی های تهاجمی دندان قرار دارید، حتماً دندان پزشک خود را در خصوص مصرف داروی سونیسر مطلع سازید.

– در صورتی که در حین درمان با این دارو دچار علائم درد در دناک، دندان و یا فک، تورم یا زخم در دناک، احساس سنگینی در فک، بی حسی و یا شل شدن دندان ها، بروز عفونت در لثه، عدم ترمیم جای دندان کشیده شده یا خروج زشتات چرکی شدید، سریعاً به دندان پزشک خود مراجعه نمایید. این علائم می توانند ناشی از استئونکروزیس فک باشند.

– در صورت داشتن مشکلات کلیوی:

پزشک برای بررسی عملکرد کلیه بیمار به صورت دوره ای تست هایی من جمله میزان پروتئین موجود در ادرار را درخواست و آن ها را ارزیابی می کند.

– در صورتی که اخیراً جراحی داشته اید یا می خواهید تحت جراحی قرار بگیرید:

داروی سونیتینیب ممکن است بر روی ترمیم زخم تأثیر گذارد. در نتیجه در این خصوص حتماً با پزشک مشورت نمایید. توصیه می گردد ۳ هفته قبل از انجام جراحی و یا پیروسه دندان پزشکی تهاجمی، مصرف داروی سونیتینیب را قطع نموده و تا ۴ هفته بعد از انجام عمل جراحی مازور تجویز نگردد تا ترمیم زخم به طور کامل گیرد.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات کیسه صفرا و یا پانکراس (و یا ابتلا به این موارد در حال حاضر):

این دارو می تواند علائمی چون: درد در ناحیه فوقانی شکم، تهوع، استفراغ و تب را ایجاد کند. این علائم می تواند نشانه اختلال التهاب در کیسه صفرا و یا پانکراس باشند.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات کبدی و یا ابتلا به این مشکلات در حال حاضر:

در صورت بروز علائمی مانند: خارش، زردی پوست و یا چشم، تیرگی ادرار، درد در ناحیه قفسه راست و قوفانی شکم در طی درمان با این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات کبدی و یا ابتلا به این مشکلات در حال حاضر:

در صورت بروز علائمی مانند: خارش، زردی پوست و یا چشم، تیرگی ادرار، درد در ناحیه قفسه راست و قوفانی شکم در طی درمان با این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات کبدی و یا ابتلا به این مشکلات در حال حاضر:

در صورت بروز علائمی مانند: خارش، زردی پوست و یا چشم، تیرگی ادرار، درد در ناحیه قفسه راست و قوفانی شکم در طی درمان با این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات کبدی و یا ابتلا به این مشکلات در حال حاضر:

در صورت بروز علائمی مانند: خارش، زردی پوست و یا چشم، تیرگی ادرار، درد در ناحیه قفسه راست و قوفانی شکم در طی درمان با این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت داشتن سابقه مشکلات کبدی و یا ابتلا به این مشکلات در حال حاضر:

در صورت بروز علائمی مانند: خارش، زردی پوست و یا چشم، تیرگی ادرار، درد در ناحیه قفسه راست و قوفانی شکم در طی درمان با این دارو، به پزشک خود اطلاع دهید.

