

تئوزین®

شربت تئوفیلین - جی
تئوفیلین و گایافنزین

موارد و مقدار مصرف:

درمان آسم مزمن:
کودکان ۸-۱ سال: ۲۰ میلی گرم به ازای
هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه دوز
منقسم.

کودکان ۱۱-۹ سال: ۱۶ میلی گرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه
دوز منقسم.

کودکان ۱۵-۱۲ سال: ۱۳ میلی گرم به
ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در سه
دوز منقسم.

بزرگسالان سالم و غیر سیگاری: ۱۰ میلی
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
روزانه در سه دوز منقسم.

بزرگسالان سالم و سیگاری: ۱۶ میلی

گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
روزانه در سه دوز منقسم.

موارد منع مصرف:

حساسیت به تئوفیلین یا گایافنزین یا هر
یک از اجزای دارو

بارداری و شیردهی:

با احتیاط مصرف شود.

احتیاط های مصرف:

این دارو در افراد زیر با احتیاط مصرف
شود:

در بیماران با سابقه زخم معده، پرکاری
تیروئید، صرع، بیماری های قلبی،
سالمندان، تب، بالا بودن فشار خون، در
افراد با ریسک هایپوکالمی (کم بودن
پتاسیم خون)

تداخلات:

سایمتیدین، سیپروفلوکساسین،
آدنوزین، کافئین، آلوپورینول،

فلوکونازول، وراپامیل، دیلتیازم، لیتیم،
اریترومایسین، گارپامازپین،
کلاریترومایسین، آسیکلوویر،
کتوکونازول، ریفامپین، متوتروکسات.

عوارض جانبی:

تشنج، آریتمی، تحریک سیستم عصبی،
اسهال، سردرد، بی خوابی، تهوع،
افزایش ضربان قلب، استفراغ،
هایپوکالمی، کاهش فشار خون، تپش
قلب.

تاریخ آخرین بازرینی و تدوین:

اسفند ۱۳۹۷

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۲۰