

Topical ointment Betamethasone 0.1 %

پماد موضعی بنامتازون ۰/۱ درصد

هر پماد ۱۵ گرمی، حاوی ۰/۱ گرم بنامتازون (به صورت والرات) در هر ۱۰۰ گرم پماد می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و به توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و با داروساز اطلاع رسانی کنید.

- بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر

دسته دارویی:

بنامتازون از خانواده کورتیکو استروئیدها می باشد و با داشتن اثرات ضد التهابی، ضد خارش و متعین کننده گی عروق نقش خود را ایفا می کند.

مکانیسم اثر:

کورتیکو استروئیدها با اثر روی لکوسیت ها و ماکروفاژها (سلول های محافظتی بدن) از ایجاد التهاب، ادم، ترشح هیستامین، تولید کمپلمان های التهابی و خارش جلوگیری می نمایند.

موارد مصرف دارو:

بنامتازون در کمک به کاهش قرمزی و خارش پوست در بیماری هایی چون اگزما، درماتیت (التهاب پوستی) و پسوریازیس کاربرد دارد.

نحوه و مقدار مصرف:

لایه نازکی از دارو را روی ناحیه مورد نظر مالیده و به آرامی مالش دهید. تعداد دفعات دقیق مصرف را از پزشک و یا داروساز خود سوال نمایید. مصرف معمول این دارو، ۱-۲ بار در روز می باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به بنامتازون و یا سایر ترکیبات به کار رفته در این دارو.
در کودکان زیر ۱ سال.
در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، مصرف بنامتازون، باعث بدتر شدن وضعیت فعلی فرد می گردد:
• آکنه

• سرخ شدن شدید پوست در بینی و اطراف آن (روزاسه)

• بثورات قرمز لکه دار در اطراف دهان (درماتیت محیطی).

• عفونت پوستی (تتها در صورت همراهی داروهای ضد عفونت، مصرف بنامتازون امکان پذیر می باشد).

• خارش های پوستی که به دنبال التهاب ایجاد نشده باشند.

بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی منوط به تجویز پزشک می باشد.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

در صورت وجود موارد ذیل، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
• در صورت داشتن سابقه حساسیت به سایر استروئیدها

• در صورت بیماری از دروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن

• در صورت بیماری و مشکلات چشمی مانند کاتاراکت و فشار چشم

• در صورت وجود عفونت مزمن در پا

• در صورتی که دارو را برای سطح بزرگی از بدن استفاده می نمایید.

• در صورتی که این دارو را در نواحی آسیب دیده و چین های پوستی استفاده می نمایید.

• حناکثر ۵ روز این دارو را برای کودکان و روی پوست صورت (به دلیل نازک تر بودن پوست در این قسمت) استفاده کنید.

• از استعمال دارو در نواحی دور چشم و داخل چشم خودداری نمایید.

• بیشتر از میزان توصیه شده مصرف نکنید.

• در صورتی که بعد از استفاده از این دارو به مدت ۲-۴ هفته، بهبودی حاصل نشود، با پزشک خود مشورت نمایید.

• در صورتی که بعد از مصرف این دارو، علائمتان بدتر و در ناحیه مورد استفاده راش و تورم ایجاد شد، دارو را قطع کرده و با پزشک خود تماس حاصل فرمایید.

• بدون تجویز پزشک از باسمنان کردن موضع اجتناب نمایید.

تداخلات دارویی:

در صورتی که در طول درمان با بنامتازون موضعی می باشید در صورت مصصرف سایر داروها مخصوصا داروهای ریتوناویر و اینتراکوآزول به پزشک خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای نیز گردد، اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. واکنش های جانبی همراه با این دارو، به ندرت ایجاد می گردد که برخی از آن عوارض شامل: سوزش، خارش، تحریک، خشکی، عفونت ثانویه و درماتیت می باشد.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

دارو را در محیط خشک و خنک نگهداری کنید.

دارو را در دور دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضای مصرف نکنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در داروساز خود در مورد نحوه دور انداختن آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: دی ۱۴۰۰



داروسازی خوارزمی
Kharazmi
pharmaceutical Co.

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۳-۱۷ کدپستی: ۱۳۸۹۷۱۵۲۱
info@kharazmipharm.com - www.kharazmipharm.com