

Enteric coated capsules

Pantoflex 40
Pantoprazole



بیمارانی که از قبل خطر هیپوکسمی دارند (مانند هیپواریتروئیدیسم) توصیه می گردد. در تارسانی شدید کبدی ممکن است نیاز به کاهش دوز باشد. عملکرد کبد باید به طور منظم کنترل شود و در صورت افزایش اثرهای نامی کبدی، درمان متوقف شود. استفاده طولانی مدت روزانه (به عنوان مثال، بیش از ۳ سال) ممکن است منجر به سوء جذب یا کمبود سیانوکوبالامین شود.

با توجه به امکان افزایش ریسک ابتلا به اسهال مرتبط با کلستریدیوم دیفیسل، در صورت ابتلا به اسهال و عدم بهبود علائم، مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.

بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری در صورت نیاز و تحت نظر پزشک مجاز است. این دارو به شیر مادر منتقل می شود. قبل از شیردهی با پزشک خود مشورت کنید.

تداخلات دارویی:

در صورت هر یک از داروهای زیر، قبل از مصرف پنتوپرازول با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
دیانام، فنی توئین، وارفارین، داسلاتینیب، کتوتولازول، وریکونازول و ایتراکانوزول، آنازانویر، دیگوکسین، تاکرولیموس، فلوو کسامین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمیشود.

مهارکننده های پمپ پروتون عموماً به خوبی تحمل می شوند و بروز عوارض جانبی نسبتاً نادر است. عوارض جانبی معمول عبارتند از سردرد، اسهال، تهوع و یبورات پوستی. در صورت شدت گرفتن علائم ذکر شده، مصرف دارو را قطع و با پزشک مشورت نمایید.

عوارض کمتر شایع شامل خارش، سرگیجه، خستگی، بیبوست، استراخ، درد فک، درد شکم، آرتراژی و میالژی، کپیر و خشکی دهان.

مهارکننده های پمپ پروتون ممکن است خطر عفونت های گوارشی را به دلیل اثرات سرکوب کننده اسیدشان افزایش دهند.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

کپسول انتریک کوتد

پنتوفلکس ۴۰
پنتوپرازول



محصول کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول ۴۰ میلی گرم با نام تجاری پنتوفلکس ۴۰ در پلیسترهای ۱۰ عددی و جعبه های ۳۰ عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

*وجود هر گونه حساسیت

*بارداری و یا شیردهی

*استفاده از سایر داروها

دسته دارویی:

مهارکننده پمپ پروتون

موارد و مقدار مصرف دارو:

این دارو با کاهش ترشح اسید معده در درمان بیماری های زخم معده و دوازدهه، رفلاکس معده (برگشت اسید از معده به مری)، سندروم زولینگر-الیسون و در پروتکل درمان هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو توسط پزشک مشخص می شود، اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

درمان رفلاکس معده به مری: ۲۰ الی ۴۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۴ هفته

درمان زخم معده: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۸ الی ۴ هفته

درمان زخم دوازدهه: ۴۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۲ الی ۴ هفته

پیشگیری از زخم های گوارشی ناشی از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی: ۲۰ میلی گرم یک بار در روز

در صورت مصرف یک بار در روز، دارو را صبح ها همراه و یا بدون غذا مصرف نمایید.

هشدار ها و احتیاطات مصرف:

قبل از استفاده از پنتوپرازول، اگر به آن یا داروهای مشابه (مانند لنزوپرازول، امیزازول) حساسیت دارید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

در صورت داشتن: سوزش سر دل همراه با سبکی سر، تعریق، سرگیجه، درد قفسه سینه، افک ابازو/شانه (مخصوصاً با تنگی نفس، تعریق غیر معمول)، کاهش وزن غیر قابل توضیح، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

مهارکننده های پمپ پروتون (مانند پنتوپرازول) در صورت مصرف با دوز بالا و یا استفاده طولانی مدت ممکن است باعث اختلال در جذب مواد معدنی از جمله کلسیم و منیزیم گردند. نظارت بر سطوح منیزیم و کلسیم قبل از شروع درمان و به طور دوره ای در حین درمان در

شرکت داروسازی
خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۹۷۵۵۱۲ تلفن: ۰۲۱-۲۳۵۴۳۱۲-۱۷
info@kharazmipharm.com www.kharazmipharm.com

ATW.407/LF.0