



هشدارها و احتیاط ها:

پیش از مصرف این فراورده با پزشک و داروساز خود مشورت کنید در صورتی که دارای دیابت نوع یک هستید و یا در صورتی که انسولین یا داروهای کنترل کننده دیابت مصرف می کنید.

تداخلات دارویی:

پیش از شروع همزمان مصرف این فراورده با سایر داروها مخصوصا داروهای زیر، پزشک معالج خود را مطلع سازید:
 - داروهای افزایش دهنده ادرار (دیورتیک ها)
 - داروهای ضد درد و ضد التهاب مانند ایبوپروفن
 - داروهای کاهش دهنده فشارخون
 - داروهای که مقدار متفورمین خون را تحت تاثیر قرار میدهند مانند وراپامیل، ساینمیدین، تری متوپریم
 - داروهای که در کنترل تشنج کاربرد دارند مانند کاربامازین، فنوباریتال و فنی توتین
 - ریفامپیسین که در درمان سل کاربرد دارد
 - داروهای که در بیماریهای التهابی مثل آسم مصرف می شوند مانند کورتیکواستروئیدها
 - داروهای حاوی الکلی

عوارض جانبی دارو:

علائم کاهش قند خون شامل: لرزیدن، تعریق، اضطراب، تاری دید، رنگ پریدی، تغییر خلق و خو یا گیجی
 عوارض متداول شامل: اسهال، افزایش آنزیم لیباز خون، حالت تهوع
 عوارض غیرمتداول شامل: التهاب بینی یا حلق، سرفه، کاهش اشتها، استفراغ، افزایش آنزیم آمیلاز در خون، خارش
 مصرف این دارو می تواند عارضه ای نادر و پرخطر به نام لاکتیک اسیدوز ایجاد کند در صورت بروز این عارضه باید مصرف فراورده قطع و سریعاً به بیمارستان مراجعه شود. علائم این عارضه شامل: استفراغ، درد شکمی، گرفتگی عضلانی، خستگی مزمن، تنفس سخت، کاهش دمای بدن و ضربان قلب است.

شرایط نگهداری:

دارو را در جای خشک دور از نور مستقیم خورشید و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
 دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: خرداد ۱۴۰۴

هر عدد قرص خوراکی روکشدار حاوی لیناگلیپتین و متفورمین هیدروکلراید به عنوان ماده موثره دارویی می باشد که در مقادیر ترکیبی ذیل توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود:

- قرص روکشدار خط دار لیناگلیپتین ۲/۵ میلی گرم + متفورمین ۵۰۰ میلی گرم
 - قرص روکشدار لیناگلیپتین ۲/۵ میلی گرم + متفورمین ۱۰۰۰ میلی گرم

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
 قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- * وجود هر گونه حساسیت * بارداری و یا شیردهی
- * استفاده از سایر داروها * ابتلا به بیماری های دیگر
- * اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد مصرف دارو:

هر دو ماده فعال دارویی موجود در این فراورده جهت کنترل سطح قند خون در بزرگسالان دارای دیابت نوع دوم استفاده می شوند.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف این دارو توسط پزشک تعیین میشود. مصرف این فراورده همراه با غذا سبب کاهش ریسک مشکلات گوارشی در بیماران میشود. بیشترین مقدار مجاز مصرف روزانه ۵ میلی گرم لیناگلیپتین و ۲۰۰۰ میلی گرم متفورمین است.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، از مصرف این دارو خودداری کنید.
 - حساسیت به لیناگلیپتین یا متفورمین یا هر یک از اجزا سازنده این دارو
 - کاهش عملکرد کلیوی
 - دیابت کنترل نشده
 - عفونت مزمن مانند عفونت ریوی
 - از دست دادن آب بدن (دهیدراتیشن)
 - نارسایی مزمن قلبی یا حمله اخیر قلبی
 - مشکلات کبدی

- مصرف بیش از اندازه الکلی

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری از مصرف این فراورده اجتناب کنید.
 در صورتی که شیرده هستید درباره مصرف این فراورده حین شیردهی با پزشک خود مشورت کنید.