

- در صورت بروز اختلال حافظه.
- در صورت گرفتگی مژمن قفسه سینه.
- در افسردگی شدید، روعه اضطراب، تحریک پذیری، حملات خشم، کابوس و افزایش بی خوابی، توهم، اختلالات رفتاری شدید که در آن کنترل بر رفتار و اعمال فرد مختل می شود (روان پرسی)، اختلالات رفتاری، افزایش میل به خودکشی.
- در صورت داشتن کلونوم با زاویه باز، با احتیاط مصرف شود.

بازداری:

مطالعات کافی از مصرف آلپروزولام در زنان باردار وجود ندارد. مصرف آلپروزولام در صورت اقدام برای بارداری و در زمان بارداری جز با صلاحدید پزشک امکان پذیر نمیباشد. مشاهدات در انسان نشان داده است که ماده آلپروزولام می تواند برای جنین مضر باشد.

تداخلات دارویی:

خطر مصرف این دارو در شیردهی بر روی نوزاد وجود دارد. بنابراین در طول درمان با آلپروزولام نباید نوزاد از شیر مادر تغذیه شود.

تداخلات دارویی:
آنانازول، بوپرنورفین، کدئین، فنتانیل، کلارپروماید، مین، اپیزوناید، اپتراکانول، کتوتازول، مورفین، متادون، اکسی کدون، ریتوناویر، ترامادول، بنزودون، فلوکسامین، فلوکستین، سرتراپین، امپمیدین، قرص های ضد آلودگی خوراکی، دلیتام، کارابامازین، فنی توئین، هاپرینکوم، پرفوراتوم، ریفامپین، مین، دیگوکسین، کلوزاپین، پروپوکسین، آلوکاتامین، سیکلوسپورین، آمبودارون، نیکاردپین و نیفیدپین.

عوارض جانبی:
بیسایر شایع:

افسردگی، احساس خواب آلودگی و خستگی، حرکات تند و ناهماهنگ، ناتوانی در به خاطر سپردن اطلاعات، لکنت زبان، سر گیجه، سبکی سر، سردرد، یبوست، خستگی، تحریک پذیری، افزایش اشتها، یبوست، خشکی دهان، افزایش وزن، بروز ضایعات پوستی، شایع: کاهش فشار خون، از دست دادن اشتها، سردرگمی، اختلال در عملکرد جنسی، اضطراب یا آشفتگی، بی خوابی (ناتوانی یا اختلال در خواب)، مشکل در تعادل و بی ثباتی، از دست دادن هوشیاری یا تمرکز، احساس ضعف و خواب آلودگی، احساس سستی، لرزش، دو بینی یا تاری دید، بروز واکنش های پوستی، تنگی نفس، احتقان بینی، بی اختیاری ادرار، درد و گرفتگی در ناحیه کمر و ران، های دیس منوره (درد های شدید قاعدگی)، اسپاسم یا ضعف عضلانی، استفراغ.

غیر شایع:
احساس شادی یا هیجان بیش از حد، رفتار های غیر عادی، توهم (دیدن یا شنیدن چیزهایی که وجود ندارند)، احساس آشفتگی یا عصبانیت، وابستگی به مواد مخدر، بروز علائم سندرم ترک.

شرایط نگهداری:
دارو را در جای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمائید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آذر ۱۴۰۱

هر قرص از این دارو، حاوی ۱ میلی گرم آلپروزولام می باشد که در بیست و یک عددی و جعبه های ۲۰ عددی و همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمائید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.
وجود هر گونه حساسیت
استفاده از سایر داروها
* بارداری یا شیردهی
* ابتلا به بیماری های دیگر

دسته دارویی:

آلپروزولام جزء داروهای دسته بنزودیازپین طبقه بندی می شود.

مکانیسم اثر:

آلپروزولام با اتصال به گیرنده گابا (انتقال دهنده عصبی) در سیستم عصبی مرکزی، موجب افزایش فعالیت مهارکننده می شود و به بهبود خواب و کاهش اضطراب کمک می نماید.

موارد و مقدار مصرف دارو:
آلپروزولام میبایست دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف شود. دوز عمومی مصرف به شرح ذیل می باشد:

بزرگسالان:

درمان اضطراب (درمان کمکی و یا تک درمانی):

آلپروزولام معمولاً در چند هفته ابتدائی درمان، جهت تسکین علائم بیمارمان دارای اضطراب و نینک تجویز می گردد.

۱-۵/ میلی گرم یک بار در روز (دوز دارو می تواند بر اساس پاسخ به درمان و تحمل بیمار بر اساس نظر پزشک افزایش یابد)

در بیماران سالمندان دارو با دوز کمتری آغاز و به آرامی توسط پزشک افزایش می یابد.

کودکان:

درمان اختلال نینک:

۱-۵/ میلی گرم یک بار در روز. در صورت نیاز دوز درمانی در بازه های زمانی ۳-۴ روزه افزایش می یابد. حداکثر دوز مجاز مصرف روزانه: ۱۰ میلی گرم

نحوه مصرف:

آلپروزولام را هر روز در ساعت معینی همراه با یک لیوان آب مصرف نمائید. از شکستن، خرد کردن و یا جویدن قرص خودداری نمائید.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به آلپروزولام و یا سایر بنزودیازپین ها
- کلونوم خاوه زایه بسته

- در صورت مصرف همزمان با داروهای مهار کننده قوی سیتوکروم مانند اپتراکانول و کتوتازول

- در صورت ضعف شدید عضلات (میاستنی گراویس)
- در صورت اختلال شدید روی مانند آپنه در خواب (قطع تنفس در خواب)

- تارسانی شدید کبدی
هشدارها و احتیاطات مصرف:

- در صورت نیاز به قطع دارو، هر ۲-۳ هفته، دوز درمانی در حدود ۲۵٪ کاهش می یابد.
- مصرف این دارو در سالمندان باید با احتیاط صورت گیرد. این دارو می تواند ریسک اختلال شناختی، توهم، غش کردن و بروز شکستگی را در سالمندان افزایش دهد.

- در صورت وجود حساسیت به بیماری روانی که نیاز به بستری در بیمارستان داشته است.
- در صورت وجود مشکلات ریوی، کبدی و کلیوی

- مصرف این دارو می تواند موجب بروز دیسوس سیستم عصبی مرکزی همراه با علائمی چون اختلال در عملکرد فیزیکی و ذهنی گردد. لذا ضمن درمان با این دارو از انجام آموری که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمائید.

- از مصرف همزمان این دارو با الکل خودداری نمائید.
- در صورت مشاهده کاهش اثر بخشی پس از چندین هفته مصرف دارو.

- در صورت بروز وابستگی جسمانی و روانی