

مصرف فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده چنانچه از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن مانند آزاتیوپرین، سیکلوسپورین، مایکوفنولات، سیرولیموس و تاکرولیموس، کورتیکواستروئیدها و مانند آنها استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع نمایید.

عوارض جانبی:

اکیناسه میتواند باعث واکنشهای آلرژیک در بیماران مستعد آلرژی شود. در صورت بروز علائم آلرژیک شدید مانند واکنش آنافیلاکتیک شامل احساس سرگیجه یا ضعف، مشکلات تنفسی یا خس خس سینه، ضریان قلب سریع، بثورات پوستی و تورم صورت به خصوص زبان و گلو، مصرف محصول را متوقف کرده و فوراً به مرکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف این فرآورده پس از گذشتن تاریخ انقضاء آن خودداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه دور انداختن آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

دارنده پروانه ساخت: شرکت داروسازی خوارزمی، ساخت ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: تیر ۱۴۰۴

هر کپسول نرم ژلاتینی حاوی ۴۰۰ میلی گرم عصاره اکیناسه می باشد که در بلیسترهای ۱۵ عددی و جعبه های ۶۰ عددی همراه با متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

*قبل از مصرف این فرآورده، متن راهنما را به طور کامل مطالعه کنید و آن را نزد خود نگه دارید زیرا حاوی اطلاعات مهمی در مورد این محصول می باشد.
*در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی می توانید با پزشک خود مشورت نمایید. این می تواند شامل هرگونه عارضه جانبی باشد که در این بروشور قید نشده است.

*در صورت داشتن سوالات بیشتر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

موارد مصرف:

تقویت سیستم ایمنی بدن

– کمک به کاهش علائم سرماخوردگی و عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی

مقدار مصرف:

بزرگسالان: یک الی سه عدد کپسول نرم ژلاتینی در روز یا مطابق دستور پزشک همراه یک لیوان آب مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به مواد موثره یا سایر ترکیبات جانبی به کار رفته در این محصول از مصرف این فرآورده خودداری نمایید.

بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری یا شیردهی قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

در صورت تداوم و یا بدتر شدن علائم بیماری، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به بیماری های سیستمیک پیش رونده نظیر توبرکلوزیس، کلاژنوزیس، ماتیلیل اسکلروزیس، ایدز و یا بیماریهای خود ایمنی، قبل از