

معالجمكان پذيرى مى باشد.

هشدارها:

در بيماران مبتلا به صرع يا احتياط مصرف شود .

موارد احتياط:

در صورت حساسيت نسبت به اين دارو و تركيبات مشابه (هيدروكسى زين) از مصرف آن خوددارى شود. مصرف اين دارو ممكن است سبب خواب آلودگى شود، لذا ضمن درمان با اين دارو از رانندگى و يا كار با

ماشين آلاتى كه نياز به هوشيارى كامل دارد خوددارى نماييد.

در صورت به وجود آمدن هرگونه عارضه جديد به هنگام

استفاده از اين دارو، پزشك معالج را آگاه سازيد.

از مصرف اين دارو پيش از مقدار و مدت توصيه شده توسط پزشك خوددارى كنيد.

تداخلات دارويى:

كدئين، الكل، داروهاى آرام بخش (همانند لورازپام، زولپيدم و آلپرازولام)، كلرفينرامين، ديفن هيدرامين، تتوفيلين

عوارض جانبى دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانى ممكن است باعث بروز بعضى عوارض ناخواسته نيز شود. اگر چه همه اين عوارض در يك فرد ديده نمى شود اما در صورت بروز هر يك از آن ها ضمن قطع مصرف دارو با پزشك مشورت شود: احساس خواب آلودگى، خستگى يا ضعف غير معمول و خشكى دهان، درد شكم .

شرائط نگهدارى:

دارو را در دماى کمتر از ۳۰ درجه سانتى گراد دور از نور و رطوبت نگهدارى نماييد. دارو، دور از دسترس كودكان نگهدارى شود.

ساخت شركت داروسازى خوارزمى، تهران - ايران
تاريخ اخيرين تدوين و بازبينى: تير ۱۴۰۴

هر قرص روکشدار سیترازم®، حاوی ستیریزین ۱۰ میلی گرم که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- وجود هر گونه حساسیت - بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها - ابتدا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو بسته به شرایط بیماری و بیمار تجویز می گردد.

مقدار مصرف عمومی:

علائم آلرژی همانند تب یونجه، کهیر، التهاب پوستی:

- کودکان ۵-۲ سال: ۲/۵ میلی گرم دو بار در روز

- کودکان ۱۱-۶ سال: ۵ میلی گرم دو بار در روز

- کودکان ۱۷-۱۲ سال: ۱۰ میلی گرم یک بار در روز

- بزرگسالان: ۱۰ میلی گرم یکبار در روز

نحوه مصرف:

دارو را به همراه یک لیوان آب مصرف نمایید.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو به محض به یاد آوردن، آن را

مصرف نمایید، اما اگر زمان مصرف نوبت بعدی دارو رسیده باشد، از نوبت فراموش شده چشم پوشی کنید و مقدار مصرف

نوبت بعدی را نیز دو برابر ننمایید.

در صورت بروز تحریکات معده در اثر مصرف این دارو می توانید آن را با غذا یا شیر مصرف کنید.

موارد منع مصرف:

در بيماران مبتلا به پورفيرى

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی تنها با تجویز پزشک