

Scored Tablet Tralgin® 50 Tramadol

اعتیاد به سایر مسکن های اپیوئیدی، اختلالات هوشیاری، ضربه مغزی یا هر گونه اختلال مغزی مانند غوغوت یا نومور، مشکلات تنفسی، سابقه حملات صرع، اختلالات کلیوی یا کبدی، افزایش فشار داخل جمجمه، دیابت.

تداخلات دارویی:

اگر هر یک از داروهای زیر را مصرف می کنید یا اخیراً مصرف کرده اید، قبل از مصرف ترالژین® به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

کاربامازین، بوپرنورفین، پنتازوسین، سایر مسکن ها مانند مورفین و کدئین، انداناسترون، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز، آنتی هیستامین هایی که باعث خواب آلودگی می شوند (مانند هیدروکسی زین)، داروهای آرام بخش مانند بنزودیازپین ها، داروهای مورد استفاده برای درمان صرع، درد عصبی یا اضطراب (مانند گاباپنتین و پراگالین)، تالیدومید، باربیتورات ها، فئوتیازین، بوتیروفنیل، باکالوفن، داروهای که ممکن است آنزیم های خاص کبدی را مهار کنند (مانند کتوکازول و اریترومیسین).

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود اما در صورت بروز آن یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

در شرایط خفیف خستگی، مشکل در تنفس، تورم پلک ها، صورت یا لب ها، بثورات پوستی یا خارش، تشنج، خرابان قلب آهسته مصرف دارو را قطع و بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه نمایید. عوارض بسیار شایع شامل: تهوع، سرگیجه، بیوسه، تیرگی، خشکی دهان، سردرد، استفراغ، خستگی، خواب آلودگی

عوارض شایع شامل: ناراحتی معده، اسهال، اثرات بر قلب و گردش خون (ضربان قلب سریع) عوارض شایع شامل: ضعف عضلانی، تغییر اشتها، لرزش، انقباض عضلانی، حرکات نامهارنگ، از دست دادن کتله هوشیاری (سنگوب) اختلالات گفتاری، غش، افزایش فشارخون، تاری دید، گشاد شدن بیش از حد مردمک ها (میدریاز)، انقباض مردمک ها (میوز)، مشکل یا درد در دفع ادرار، دفع ادرار کمتر از حد طبیعی (دیسمیووریا)، شکایات روانی ممکن است پس از درمان با داروهای مخدر شود که شدت و ماهیت آنها ممکن است متفاوت باشد، واکنش های آلرژیک و شوک، بدتر شدن آسم، تنگی نفس، علائم ترک در صورت قطع ناگهانی درمان.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضای آن مصرف نکنید.

هیچ دارویی را از طریق فواصل یا زمانه های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

شرکت داروسازی
خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پنجمین پست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۷۹۵۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۴۱۲-۱۷
info@kharazmipharm.com www.kharazmipharm.com

قرص خط دار ترالژین® ۵۰ ترامادول

قرص خوراکی ترالژین® ۵۰، حاوی ۵۰ میلی گرم از ماده دارویی ترامادول هیدروکلراید می باشد، که در بلیسترهای ۱۰ عددی و جعبه های ۱۰۰ عددی به همراه بروشور راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و به توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید.

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری های دیگر
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد و مقدار مصرف دارو:

ترامادول با اتصال به گیرنده های MA اپیوئیدی به عنوان یک آگونیست ضعیف اپیوئیدی عمل می کند و همچنین بازجذب سروتونین و نوراپینفرین را مهار می کند و به این ترتیب موجب کاهش درد میگردد.

دوز مصرف دارو توسط پزشک و با توجه به شرایط بیمار تعیین میگردد. دوزهای خوراکی معمول ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت است. کل دوز خوراکی روزانه نباید از ۴۰۰ میلی گرم تجاوز کند.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود حساسیت به ترامادول یا هر یک از مواد تشکیل دهنده قرص در مسمومیت حاد یا الککل، قرص های خواب آور، مسکن ها یا سایر داروهای روانگردان اگر در دو هفته گذشته از داروهای مهارکننده های MAO (مانند سلازین و ترانیل سیپرومین) مصرف کرده اید و یا در حال مصرف هستید

در صورت بیماری شدید کبدی یا بیماری شدید کلیوی

در صورت ابتلا به بیماری صرع کنترل نشده

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف ترالژین® در بارداری و شیردهی جز با صلاحدید پزشک متخصص توصیه نمی شود.

هشدارها:

اگر به دلیل ترک داروی دیگری تحت درمان هستید یا به داروی دیگری وابسته هستید، به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورت قطع مصرف، این دارو می تواند علائم ترک را ایجاد کند. علائم ترک می تواند شامل بی قراری، مشکل در خواب، تحریک پذیری، اضطراب، افزایش فشارخون، احساس بیماری، اسهال، از دست دادن اشتها، لرزش، یا تیرگی باشد. مهم است که مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید و یا پزشک خود جهت تشریحی دوز دارو مشورت نمایید. مصرف دوزهای بالاتر یا دوزهای مکرر اپیوئیدها ممکن است خطر اعتیاد را افزایش دهد. استفاده بیش از حد و استفاده نادرست می تواند منجر به مسمومیت و یا مرگ شود.

این دارو می تواند باعث اختلالات تنفسی مرتبط با خواب مانند آپنه خواب و هیپوکسمی مرتبط با خواب (اصطلاح پایین اکسیژن در خون) شود. علائم می تواند شامل مکث تنفس در طول خواب، بیداری شبانه به دلیل تنگی نفس، مشکلات در حفظ خواب یا خواب آلودگی بیش از حد در طول روز باشد. در صورت مشاهده این علائم، با پزشک خود تماس بگیرید. کاهش دوز ممکن است توسط پزشک شما در نظر گرفته شود.

موارد احتیاط:

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:

ATW.365/LF/0