


IBUPROFEN

ORAL DROPS

(SUSPENSION)



قطره خوراکی ایبوپروفن

سوسپانسیون خوراکی ایبوپروفن، حاوی ۴۰ میلی گرم ایبوپروفن در هر ۱ میلی لیتر می باشد که در جعبه های یک عددی به همراه یک قطره چکان و متن راهنمای مندرج داخل جعبه، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت

* بارداری و یا شیردهی

* استفاده از سایر داروها

* ابتلا به بیماری های دیگر

– جهت کاهش تب حداکثر به مدت ۳ روز و جهت کاهش درد حداکثر به مدت ۵ روز مصرف شود.

در صورت بروز موارد زیر در حین مصرف ایبوپروفن به پزشک مراجعه کنید:

– عدم مشاهده بهبودی در علائم طی ۲۴ ساعت از مصرف دارو

– وجود قرمزی و تورم در موضع درد

– ادامه تب پس از ۳ روز از مصرف دارو

در کودکانی که جهت بهبود گلودرد ایبوپروفن استفاده می کنند، در صورتی که گلودرد شدید است، به مدت بیشتر از ۲ روز طول کشیده است یا همراه با تب یا سردرد است.

موارد و مقدار مصرف دارو:

– کاهش موقت تب

– کاهش دردهای خفیف و دردهای ناشی از سرماخوردگی، آنفلوانزا، گلودرد، سردرد و دندان درد

جدول مقدار دوز دارو بر اساس وزن و سن کودک در زیر آمده است. بهتر است جهت تعیین دوز صحیح وزن کودک ملاک قرار داده شود.

دوز دارو بر حسب نیاز میتواند هر ۶ الی ۸ ساعت (حداکثر تا ۴ بار در روز) تکرار شود.

درمورد نوزادان زیر سن ۶ ماه با پزشک مشورت کنید.

وزن کودک (کیلوگرم)	سن کودک	مقدار دارو در هر وعده (میلی گرم)
۸/۱ – ۵/۴ کیلوگرم	۱۱ – ۶ ماه	۵۰ میلی گرم
۸/۱۰ – ۸/۲ کیلوگرم	۲۳ – ۱۲ ماه	۷۵ – ۸۰ میلی گرم
۳/۱۶ – ۹/۱۰ کیلوگرم	۳ – ۲ سال	۱۰۰ میلی گرم
۷/۲۱ – ۴/۱۶ کیلوگرم	۵ – ۴ سال	۱۵۰ میلی گرم
۲/۲۷ – ۱/۸ کیلوگرم	۸ – ۶ سال	۲۰۰ میلی گرم
۶/۳۲ – ۷/۲۷ کیلوگرم	۱۰ – ۹ سال	۲۵۰ – ۲۰۰ میلی گرم
۲/۴۳ – ۲/۳۲ کیلوگرم	۱۱ سال	۳۰۰ میلی گرم

نحوه مصرف:

– همراه یا بلافاصله بعد از غذا و یا همراه با آنتی اسید مصرف شود.

– قبل از مصرف شیشه را به خوبی تکان دهید.

موارد منع مصرف:

– این دارو نباید قبل یا بعد از عمل قلب باز استفاده شود.

در صورت وجود هر یک از موارد زیر قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید:

– سابقه حساسیت به داروی آسپرین یا هر یک از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی

- در صورت وجود هرگونه حساسیت به ایبوپروفن یا هر یک از اجزای دارو
 - خونریزی یا زخم فعال گوارشی
 - سابقه آسم به دنبال مصرف آسپرین یا داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
 مصرف در بارداری و شیردهی؛
 - ایبوپروفن نباید در سه ماهه سوم بارداری استفاده شود. برای مصرف در سایر
 ماه های بارداری با پزشک معالج خود مشورت کنید.
 - در دوران شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک استفاده شود.

هشدارها:

- مصرف این دارو با افزایش ریسک حوادث قلبی عروقی از جمله سکته های قلبی
 همراه است. خطر بروز این حوادث با طولانی شدن مصرف دارو افزایش می یابد.
 - در صورت بروز علائم آلرژی ازجمله کهیر، تاول، قرمزی پوست، تورم صورت،
 تنگی نفس دارو را قطع و سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید.
 - در صورت بروز علائم خونریزی گوارشی از جمله احساس ضعف، وجود خون در
 مدفوع، مدفوع تیره رنگ، وجود خون در استفراغ دارو را قطع و سریعاً به پزشک
 خود مراجعه کنید.
 - این دارو نباید همراه سایر فرآورده های حاوی ایبوپروفن یا سایر داروهای
 ضدالتهاب غیر استروئیدی مصرف شود.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده میکنید، پزشک خود را
 مطلع سازید:
 الکل، بیسفوفوناتها (مثل آندرونیت)، داروهای ضد انعقاد خون، پتوکسی فیلین،
 کلپیدوگرل، تیکلوپیدین، سیبوترامین، آسپرین، داروهای ضد افسردگی
 (مانند سرترا لین، ونلافاکسین)، داروهای گاهنده فشار خون، لیتیوم، متوترکسات،
 دیگوکسین، سیکلوسپورین، تاکرولیموس، داروهای مدر، فنیثوئین، سولفونیل اوره
 (مثل گلیبنکلامید)، فلوروکینولونها (مثل سپروفلوکساسین)، ایلوپروست، ارلوتینیب،
 بتابلانرها (مثل پروپرانولول)، زیدوودین، ریتوناویر، میزوپروستول، میفپریستون،
 باکوفن

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض
 ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در
 صورت بروز آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
 واکنش های حساسیتی، خارش، راش پوستی، سردرد، سرگیجه، خستگی، عوارض
 گوارشی، خونریزی گوارشی، حالت تهوع، استفراغ، زخم معده، عوارض کلیوی،
 افزایش سطح سرمی کراتینین، نارسائی حاد کلیوی، سندروم نفروتیک، عوارض
 کبدی، آگرانولوسیتوز (کاهش تعداد گلبولهای سفید)، ترومبوسیتوپنی، آنمی
 آپلاستیک، کاهش سطح سرمی سدیم

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی
 محافظت نمایید.
 - دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
 - هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در
 مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به
 حفظ محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
 تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آبان ۱۴۰۲



ATW.235/LF.01

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال
 بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۵
 کد پستی: ۱۳۸۱۷۶۵۳۲۲ | تلفن: ۲۲۵۱۵۴۱۳-۱۷
 info@kharazmipharm.com www.kharazmipharm.com

شرکت داروسازی
خوارزمی