

ORAL SUSPENSION VELOTYL® ACETAMINOPHEN



هر ۵ میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی حاوی ۱۲۰ میلی گرم استامینوفن می باشد که در جعبه های ۱ عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

- * وجود هر گونه حساسیت
- * بارداری و یا شیردهی
- * استفاده از سایر داروها
- * ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو:

کاهش درد و تب:

جدول مقدار دوز دارو بر اساس وزن و سن کودک در زیر آمده است. بهتر است جهت تعیین دوز صحیح، وزن کودک ملاک قرار داده شود.

دوز دارو بر حسب نیاز می تواند هر ۴ الی ۶ ساعت (حداکثر ۵ بار در روز) تکرار شود.

نحوه و مقدار مصرف:

مقدار مصرف این دارو را پزشک معین می نماید. دوز مصرفی بر اساس شرایط پزشکی، پاسخ به درمان، سن، وزن، شرایط بدنی و سایر داروهای مصرفی تعیین می شود. به منظور کاهش عوارض گوارشی بهتر است با غذا مصرف شود.

دوز پیشنهادی در هر وعده:

سن	وزن	مقدار دارو در هر وعده
کودکان ۱ تا ۲ سال	۸ تا ۱۱ کیلوگرم	۱۲۰ میلی گرم
کودکان ۲ تا ۴ سال	۱۱ تا ۱۵/۹ کیلوگرم	۱۶۰ میلی گرم
کودکان ۴ تا ۶ سال	۱۶ تا ۲۱/۹ کیلوگرم	۲۴۰ میلی گرم
کودکان ۶ تا ۸ سال	۲۲ تا ۲۶/۹ کیلوگرم	۳۲۰ میلی گرم
کودکان ۸ تا ۱۰ سال	۲۷ تا ۳۱/۹ کیلوگرم	۴۰۰ میلی گرم
کودکان ۱۰ تا ۱۲ سال	۳۲ تا ۴۴ کیلوگرم	۴۸۰ میلی گرم

قبل از مصرف شیشه را به خوبی تکان دهید.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به استامینوفن یا سایر ترکیبات تشکیل دهنده

هشدارها:

در صورت بروز هرگونه واکنش حساسیتی پوستی شدید، دارو را سریعاً قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت مصرف همزمان استامینوفن و کلستیرامین، کلستیرامین را حداقل یک ساعت بعد از مصرف استامینوفن مصرف کنید.

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده بلافاصله با پزشک تماس بگیرید و یا به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

از مصرف همزمان این دارو، با سایر داروهای حاوی استامینوفن خودداری نمایید.

در کودکان زیر ۳ سال با نظر پزشک مصرف شود.

احتیاطات مصرف:

در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

در افراد با اختلال عملکرد کبدی

در افراد دچار نقص آنزیمی G6PD

در افراد مبتلا به سوء تغذیه مزمن
در افراد با اختلال کلیوی شدید نیاز به تنظیم دوز با تجویز پزشک دارد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از موارد زیر، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود
مشورت نمایید:

باربیتورها (مانند فنوباربیتال و پریمیدون)، کاربامازپین، کلستیرامین،
دایسون موضعی، داساتینیب، ایماتینیب، تتراکائین، وارفارین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض
ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در
صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

اگر کودک شما واکنش آلرژیک به این دارو داشت، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

یک واکنش آلرژیک ممکن است شامل موارد زیر باشد:

بثورات پوستی، پوسته پوسته شدن پوست، جای جوش، درد لب و دهان، تورم
صورت، تب.

اگر فرزند شما هر یک از عوارض زیر را داشت، مصرف این دارو را قطع و در اسرع
وقت به پزشک مراجعه کنید:

کبودی، گلودرد یا سایر علائم عفونت (این ها ممکن است نشانه های اختلال خونی
باشند)

درد شدید در شکم و کمر، همراه با تب (درجه حرارت بالا)، از دست دادن اشتها،
حالت تهوع و استفراغ (اینها ممکن است علائم التهاب پانکراس باشند)

موارد بسیار نادری از واکنش های جدی پوستی گزارش شده است. علائم ممکن
است شامل: قرمزی پوست، تاول، بثورات پوستی باشد. اگر واکنش های پوستی
رخ داد یا علائم پوستی موجود بدتر شد، مصرف را متوقف کنید و فوراً با پزشک
تماس بگیرید.

اگر استامینوفن به مدت طولانی (چند ماه یا بیشتر) مصرف شود، ممکن است
منجر به مشکلات کبدی و کلیوی شود، اما اگر مقدار مناسب آن در مدت زمان
کوتاهی مصرف شود، مشکلی وجود نخواهد داشت، اما ممکن است آزمایشات
عملکرد کبد تحت تأثیر قرار گیرد.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور نگهداری و از یخ زدگی
محافظت نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضای آن مصرف نکنید.

**هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در
مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.**

