

Softgel VITAMIN E 400

کپسول ژلاتینی نرم ویتامین ای ۴۰۰

تایید پزشک داروها را شروع، متوقف و یا تغییر ندهید.
ویتامین E می تواند با موارد زیر تداخل ایجاد کند:
دارو هایی با اثرات انتی پلاکتی مانند: دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی، SSR ها و ...
دارو های انتی کوآگولانت مانند وارفارین، هپارین، رپوارو کسابان، آپیکسان، دابیگاتران و ...
سیکلوپسپورین
ایروتنیک
اورلیستات: این دارو می تواند غلظت ویتامین های محلول در چربی را کاهش دهد. لذا بهتر است ویتامین های محلول در چربی را حداقل ۲ ساعت قبل و یا بعد از مصرف اورلیستات، استفاده نمایید.
کلستیرامین و کلستیپول (این دارو ها می توانند بر روی جذب ویتامین E اثر گذار باشند)
عوارض جانبی:
هر فرآورده به موارات اثرات مطلوب درمانی، می تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای نیز گردد، اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. ویتامین E معمولاً به خوبی تحمل می شود و عارضه جانبی خاصی در دوز های معین و روزانه همراه با این ویتامین دیده نشده است. برخی از عوارض در ذیل اشاره شده است.
شایع:
درد شکمی، اسهال و اختلالات گوارشی
افزایش تمایل به خونریزی (مصرف ویتامین ای در دوز های بالا در بیماران با کمبود ویتامین K و یا بیماران مصرف کننده دارو های ضد انعقاد، می تواند ریسک بروز خونریزی را افزایش دهد).
ریزش مو، سردرد، واکنش های پوستی
شرایط نگهداری:
فرآورده را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
از مصرف این فرآورده پس از گذشتن تاریخ انقضاء آن خودداری نمایید.
هیچ فرآورده ای دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزد.
از داروساز خود در مورد نحوه دور انداختن آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

دارنده پروانه ساخت: شرکت داروسازی خوارزمی، ساخت ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مرداد ۱۴۰۴

هر کپسول ژلاتینی نرم حاوی ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین E می باشد که در پلیستر های ۱۵ عددی و جعبه های ۶۰ عددی همراه با متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:
• این فرآورده برای شرایط فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
• قبل از مصرف این فرآورده، متن راهنما را به طور کامل مطالعه کنید و آن را نزد خود نگه دارید زیرا حاوی اطلاعات مهمی در مورد این محصول می باشد.
• در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی می توانید با پزشک خود مشورت نمایید، این موارد می توانند شامل هر گونه عارضه جانبی باشد که در این بروشور نیامده است.
• در صورت داشتن سوالات بیشتر با پزشک خود یا داروساز مشورت نمایید.

موارد مصرف:
کمک به تامین ویتامین ای، آنتی اکسیدانت
کپسول های ژلاتینی نرم ویتامین E با داشتن اثر آنتی اکسیدانی از آسیب رادیکال های آزاد موجود در بدن جلوگیری می نمایند و موجب حفاظت از غشاء سلولی می شوند.

مقدار و نحوه مصرف:
روزانه یک عدد کپسول را همراه با غذا و یا طبق نظر پزشک مصرف نمایید.

موارد منع مصرف:
در صورت حساسیت به ویتامین E و یا سایر ترکیبات به کار رفته در این محصول
بارداری و شیردهی:
در خصوص مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدار و احتیاطات مصرف:
این فرآورده را بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.
در صورت مصرف دارو و یا مکمل های دیگر، قبل از مصرف این محصول با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.
این ویتامین می تواند موجب لثه کمبود ویتامین K و افزایش ریسک خونریزی شود.
لذا در بیماران دارای کمبود ویتامین K، بیماران هموفیلی و یا بیماران دارای زخم های گوارشی، این ویتامین با احتیاط مصرف گردد.

در افراد دارای سابقه بروز لخته، ویتامین E باید با احتیاط مصرف گردد.
در صورت مصرف مقادیر بالای ویتامین E و داشتن قصد جراحی، توصیه می شود از یک ماه قبل، از مصرف این ویتامین خودداری و پس از بهبودی کامل و تحت نظر پزشک مجدداً شروع به مصرف آن نمایند.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد دارو های شما را تغییر دهد و یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست، بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید (از جمله دارو های بدون نسخه و محصولات گیاهی) را تهیه کرده و آن را با پزشک و یا داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون

khazarmizmi

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۶۱۶۵۱۲ تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۵۱۲-۱۷
info@khazarmizmi-pharm.com www.khazarmizmi-pharm.com

ATW.298/LF.01