

ORAL SUSPENSION

IBUPROFEN

100 MG/5ML



هر ۵ میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی حاوی ۱۰۰ میلی گرم ایبوپروفن می باشد که در جعبه های یک عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

- * وجود هر گونه حساسیت
- * بارداری و یا شیردهی
- * استفاده از سایر داروها
- * ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو:

کاهش تب و درد:

سن	مقدار در هر وعده
۶ الی ۱۲ ماه	۲/۵ میلی لیتر
۱ الی ۴ سال	۵ میلی لیتر
۴ الی ۷ سال	۷/۵ میلی لیتر
۷ الی ۱۰ سال	۱۰ میلی لیتر
۱۰ الی ۱۲ سال	۱۵ میلی لیتر

در صورت لزوم دوز مصرفی دارو هر ۶ الی ۸ ساعت قابل تکرار است. قابل ذکر است حداکثر دوز توصیه شده روزانه ۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میباشد.

موارد منع مصرف:

سوسپانسیون خوراکی ایبوپروفن در بیماران با حساسیت مفرط به ایبوپروفن منع مصرف دارد.

سوسپانسیون خوراکی ایبوپروفن نباید توسط بیماران که پس از مصرف آسپرین یا سایر NSAID ها دچار آسم، کهیر یا واکنش های آلرژیک شده اند مصرف شود.

این دارو همچنین در زمینه جراحی بای پس عروق کرونر منع مصرف دارد.

بارداری و شیردهی:

ایبوپروفن نباید در ۳ ماه آخر بارداری مصرف شود، زیرا ممکن است برای جنین مضر باشد. زنان بارداری که قصد استفاده از این محصول را دارند، باید قبل از مصرف با پزشک مشورت کنند.

هشدارها و اقدامات احتیاطی:

ایبوپروفن می تواند خطر حمله قلبی را افزایش دهد. این دارو را درست قبل یا بعد از جراحی بای پس قلب استفاده نکنید.

ایبوپروفن همچنین ممکن است باعث خونریزی معده یا روده شود که می تواند کشنده باشد. این شرایط می تواند بدون هشدار در هنگام استفاده از این دارو، به ویژه در افراد مسن رخ دهد.

بیش از دوز توصیه شده خود مصرف نکنید. مصرف بیش از حد ایبوپروفن می تواند به معده یا روده شما آسیب برساند. فقط از کمترین مقدار دارویی که برای تسکین درد، تورم یا تب خود لازم است استفاده کنید.

خطر نارسایی کلیه در کودکان دهیدراته وجود دارد بنابراین از مصرف مایعات کافی توسط کودک مطمئن شوید.

در صورت وجود هر یک از موارد زیر، قبل از مصرف این محصول با پزشک مشورت کنید:

فشار خون بالا، مشکلات کلیوی یا کبدی، آسم، دیابت، بیماری لوپوس یا بافت همبند، بیماری مزمن التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو یا بیماری کرون یا خونریزی گوارشی، آبله مرغان

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از موارد زیر، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید:

دیورتیک ها، داروهای ضد انعقاد (مانند آسپرین، وارفارین، تیکلوپیدین)، داروهای ضد فشار خون (مهارکننده های ACE مانند کاپتوپریل، بتا بلاکرها مانند آتنولول، آنتاگونیست های گیرنده آنتیوتانسین II- مانند لوزارتان)، لیتیم، مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (مانند فلوکستین)، متوترکسات، زیدوودین، کورتیکواستروئیدها (داروهای ضد التهابی مانند هیدروکورتیزون)، گلیکوزیدهای قلبی (مانند دیگوکسین)، سیکلوسپورین، تاکرولیموس، آنتی بیوتیک های کینولون (مانند سیپروفلوکساسین) سایر داروهای حاوی ایبوپروفن.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

اگر کودک شما واکنش آلرژیک به این دارو داشت، فوراً به پزشک مراجعه کنید. یک واکنش آلرژیک ممکن است شامل موارد زیر باشد:

کهیر، تنفس دشوار، تورم در صورت یا گلو یا واکنش شدید پوستی در صورت داشتن موارد زیر فوراً با پزشک خود تماس بگیرید:

تغییرات در دید، تنگی نفس، تورم، بشورات پوستی، علائم خونریزی معده (مدفوع خونی، سرفه خونی یا استفراغی که شبیه تفال قهوه است)، مشکلات کبدی (حالت تهوع، درد بالای معده، خارش، احساس خستگی، علائم شبیه آنفولانزا، از دست دادن اشتها، ادرار تیره، یرقان (زرد شدن پوست یا چشم))، گلبول های قرمز پایین، احساس سبکی سر یا تنگی نفس، ضربان قلب سریع، مشکل در تمرکز، مشکلات کلیوی (ادرار کم یا ادرار دردناک)، تورم در پاها.

عوارض جانبی رایج ایبوپروفن ممکن است شامل موارد زیر باشد:

حالت تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، سرگیجه، سردرد.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضای آن مصرف نکنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

