



هر قرص از این دارو، حاوی ۴۷/۵ میلی گرم متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش می باشد که در بیشتر های ۱۰ عددی و جعبه های ۲۰ عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری قلبی شلی تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.
* وجود هر گونه حساسیت
* بارداری و یا شیردهی
* ابتلا به بیماری های دیگر

دسته دارویی:

متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش جزء گروه داروهای قلبی -عروقی و از عوامل مسدود کننده گیرنده آدرنژیک انتخابی بتا (بتابلاکرها) می باشد.

مکانیسم اثر:

مکانیسم اثرات ضد فشار خون عوامل مسدودکننده بتا مشخص نشده است. با این حال، چندین مکانیسم ممکن پیشنهاده شده است: (۱) مهار رقابتی کانکول آمین ها در مکان های نورون آدرنژیک محیطی (به ویژه قلبی) که منجر به کاهش برون ده قلب می شود. (۲) یک اثر مرکزی که منجر به کاهش جریان سمپاتیک به اطراف می شود. و (۳) سرکوب فعالیت رنین.

موارد و مقدار مصرف دارو:

متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش میبایست دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف شود. دوز عمومی مصرف به شرح ذیل می باشد:
-فشار خون بالا بزرگسالان:
دوز معمول اولیه ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز است.
-فشار خون بالا در کودکان ۶ سال و بالاتر:
دوز شروع توصیه شده ۱ میلی گرم بر کیلوگرم، یک بار در روز می باشد که تا دریافت پاسخ بالینی افزایش می یابد بطوریکه از حداکثر دوز اولیه ۵۰ میلی گرم یک بار در روز تجاوز نشود.
-انژین صدری
دوز معمول اولیه ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز است که بر اساس پاسخ بالینی هفتگی افزایش می یابد.

تأسیس مزمن قلبی

دوز شروع توصیه شده ۲۵ میلی گرم در روز است که هر دو هفته دو برابر می شود تا به بالاترین دوز قابل تحمل یا به ۲۰۰ میلی گرم در روز برسد.

نحوه مصرف:

متورپرولول سوکسینات را هر روز طبق دستور پزشک همراه یا بعد از غذا و با یک لیوان آب مصرف نماید. قرص را به طور کامل بلعیده و از جویدن و خرد کردن آن خودداری کنید.

موارد منع مصرف:

-در صورت حساسیت به متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش و یا هر یک از اجزای آن فرآورده
برای کاربری شدید
-بزرگ قلبی بیشتر از درجه اول
-شوکر قلبی
-نارسایی قلبی چرآن نشده
-سندرم سینوس بیمار (مگر در وجود ضربان ساز دائمی)

هشدار ها و احتیاطات مصرف:

-قطع ناگهانی این دارو ممکن است ایسکمی میوکارد را تشدید کند.
-بدتر شدن نارسایی قلبی ممکن است در مصرف این دارو رخ دهد. ممکن است کاهش دوز متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش یا قطع موقت آن ضروری باشد.
-در بیماری برونش اسپاستیک: از مصرف مسدود کننده های تنه خودداری کنید.
-در سندرم فتو کروموسیتوما: این دارو باید همراه با مسدود کننده آلفا تجویز شود.

از شروع ناگهانی دوز بالا متورپرولول پیوسته رهش خودداری کنید.
-قبل از عمل جراحی، درمان مزمن بتابلاکرها را خودسرانه قطع نکنید.
-این دارو ممکن است تکی کاردی ناشی از هیپوگلیسمی را بپوشاند.
-قطع ناگهانی در تیروتوکسیکوز ممکن است باعث ایجاد طوفان تیروئید شود.

-این دارو ممکن است علائم نارسایی شریانی را تشدید کند.
-در وجود نارسایی کبدی: شروع درمان با متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش با دوزهای کم و افزایش تدریجی دوز برای پهنه سازی درمان در نظر گرفته شود. در حالی که بیمار از نظر عارضه جانبی به دقت نظارت می شود.
-برای کاهش احتمال سرگیجه یا بیهوش شدن، اگر دراز کشیده اید یا نشستید اید به آرامی بلند شوید، برای بالا یا پایین رفتن از پله ها احتیاط کنید.

بارداری:

توصیه می شود که متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش در دوران بارداری تجویز نشود، مگر اینکه توسط پزشک در نظر گرفته شود که فواید آن بیشتر از خطر احتمالی برای جنین است.

شیردهی:

توصیه می شود که متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش در دوران شیردهی تجویز نشود، مگر اینکه در نظر گرفته شود که فواید آن بیشتر از خطر احتمالی برای شیرخوار است.

تداخلات دارویی:

داروهای کاهش دهنده کاتکولامین ممکن است در تجویز همزمان با داروهای مسدودکننده بتا اثر افزایشی داشته باشند.

-در مصرف متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش، بیمارانی ممکن است به دوزهای معمول اپی نفرین که برای درمان واکنش آلرژیک استفاده می شود، پاسخ ندهند.
-مهار کننده های CYP2D6 احتمالاً غلظت متورپرولول را افزایش میدهند.
-مصرف همزمان گلیکوزیدها، کلونیدین، و دیلتیازم و وراپامیل با بتابلاکرها می تواند خطر برای کاربری را افزایش دهد.
-بتا بلاکرها از جمله متورپرولول سوکسینات پیوسته رهش ممکن است باعث تشدید فشار خون ناشی از قطع کلونیدین شود.
-الکل با خواص پیوسته رهش بودن این محصول تداخل دارد.

عوارض جانبی:

شایع ترین عوارض جانبی شامل: حس خستگی، سرگیجه، افسردگی، تنگی نفس، برادی کاربری، افت فشار خون، اسهال، خارش، بثورات پوستی است.
در صورت بروز هر یک از علائم زیر که ممکن است مربوط به یک عارضه جانبی جدی باشد، فوراً به پزشک مراجعه درمائی کنید: علائم واکنش آلرژیک، سسز گیجه خیلی شدید یا بیهوش شدن، درد قفسه سینه ای که جدید است یا بدتر شده، ضربان قلب آرام، تورم در دست ها و پاها.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
هیچ دارویی را از طریق قاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: شهریور ۱۴۰۴