

هر ۵ میلی لیتر از این فرآورده حاوی ۳۸ میلی گرم عصاره خشک برگ گیاه پیچک، ۳۸ میلی گرم عصاره دانه گریپ فروت، ۰/۵ میلی گرم ملاتونین، ۳۴ میلی گرم ویتامین ث، ۱/۷ میلی گرم زینک به صورت گلوکونات و ۶۰۰۰ میلی گرم عسل می باشد که توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می گردد.

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای شرایط فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این فرآورده موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

- * وجود هر گونه حساسیت
- * بارداری و یا شیردهی
- * استفاده از سایر داروها
- * ابتلا به بیماری های دیگر

موارد مصرف:

شربت ضد سرفه شبانه، حاوی ترکیب عسل و عصاره پیچک می باشد که به پاکسازی مخاط، تسکین سرفه های همراه با خلط، گرفتگی صدا و تحریکات گلو کمک می کند. همچنین با داشتن ملاتونین خواب راحتی را برای شما فراهم میکند. این فرآورده به واسطه داشتن ویتامین ث و زینک و عصاره دانه گریپ فروت و عسل در کمک به تقویت سیستم ایمنی نیز تاثیر گذار است.

عصاره برگ پیچک با داشتن اثر موکولیتیکی، در ارتقاء سلامتی سیستم تنفسی، تسکین سرفه و کاهش ترشح خلط کاربرد دارد.

عصاره دانه گریپ فروت نیز منبع غنی ویتامین ث، فیبر، پتاسیم، پکتین، آنتی اکسیدانت ها و سایر مواد مغذی می باشد.

ملاتونین که به طور طبیعی در بدن ساخته می شود، ریتم بیولوژیکی شبانه روزی بدن را هماهنگ کرده و به تنظیم خواب کمک می کند.

عسل ترکیبی غنی از ویتامین ها، مواد مغذی و آنتی اکسیدانت ها می باشد و از دیرباز در بیماری های مختلفی کاربرد داشته است. عسل با تسکین سرفه، کاهش طول مدت درمان آن و کاهش گلودرد کمک کننده است.

این فرآورده با داشتن زینک و ویتامین ث به رشد، تکامل و افزایش سیستم ایمنی کودکان کمک می کند. ویتامین ث یک کوآنزیم ضروری برای تشکیل کلاژن، ترمیم بافت، سنتز لیپید و پروتئین است و به عنوان یک آنتی اکسیدان برای بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی (متابولیسم، جذب آهن و فولیک اسید، افزایش مقاومت به عفونت و حفظ یکپارچگی دیواره عروق) ضروری است.

مقدار مصرف:

قبل از هر بار مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.

کودکان ۴-۲ سال: ۵ میلی لیتر قبل از زمان خواب

کودکان ۴ سال به بالا: ۱۰ میلی لیتر قبل از زمان خواب

این فرآورده را قبل از خواب و با توجه به نظر پزشک خود مصرف نمایید.

توجه کنید که این فرآورده نباید بیش از دو بار در طی شبانه روز مصرف گردد.

موارد منع مصرف:

مصرف این فرآورده در کودکان زیر ۲ سال توصیه نمی گردد.

منع مصرف در بیماران با سابقه حساسیت به هر یک از مواد تشکیل دهنده این فرآورده در افراد با سابقه هایپرآگزالوریا

احتیاط مصرف:

در صورت وجود موارد زیر قبل از مصرف این فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

بیماران کلیوی و کبدی

بیماران با گاستریت و دارای زخم های معده

بیماران با بیماری های خود ایمنی

مصرف همزمان فرآورده های حاوی گیاه پیچک با محصولات ضد سرفه حاوی اپیوئید بدون تجویز پزشک توصیه نمی گردد.

در صورت ادامه یافتن علائم بیماری بیش از یک هفته با پزشک مشورت نمایید.

در کودکان ۴-۲ سال در صورت وجود سرفه های مکرر و مداوم، بررسی پزشکی ضروری است.

به دلیل اثرات خواب آوری این فرآورده، در زمان مصرف از رانندگی و یا کار با ماشین آلات پرهیز نمایید.
این فرآورده حاوی ۰/۵٪ حجمی -حجمی اتانول ۹۶٪ می باشد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف موارد زیر قبل از استفاده از این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید:
فلوفنازین، بیس فسفونات ها، تتراسایکلین ها، فلونوروکینولون ها مانند سیپروفلوکساسین، ایمی پرامین، آمی تریپتیلین، سایمتیدین، تیوریدازین، الکل، بنزودیازپین ها مانند الپرازولام دارو های ضد انعقاد خون من جمله: آرگاتروبان، آسپیرین، وارفارین، کلپیدوگرل، فلووکسسامین، متوکسالن، باربیتوراتها، فنی توئین، لوودوپا، دکسترومتورفان، کدئین، آمیودارون، سرتینیب، دروندارون، اورولیموس، ایماتینیب، ایوابرادین، نیفیدیپین، نیمودیپین، پیموزاید، رگورافنیب، تاکرولیموس، سیرولیموس، اپریتانت، بوسوتینیب، دومپریدون، آلیسکیرین، سیزاپراید، سونیتینیب، سیکلوسپورین، سیمواستاتین و آنورواستاتین، زوپیکلون، رانولازین، هیدروکسی زین، فنتانیل، اپلرون، داپوکستین، کلکشی سین، سیلدنافیل، سالمترول، آریپیپرازول، آملودیپین، هیدروکودون، وراپامیل، تاکرولیموس، سرترالین، ایتراکونازول، دیلتیازم، کلومیپرامین، کاربامازپین.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض گوارشی (درد شکمی، تهوع، اسهال)، هایپراگزالوریا، سردرد، پلوری (افزایش ادرار)، واکنش های حساسیتی شامل کهیر، سختی تنفس، ورم صورت، لب ها، زبان و گلو، خواب آلودگی، کمر درد، درد مفاصل، بی حسی و احساس گزگز، سوزش و یا درد در دست و پا.

بارداری و شیردهی:

توصیه می گردد در دوران بارداری و شیردهی این فرآورده تنها تحت نظر پزشک معالج مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

فرآورده را، داخل جعبه اصلی خود و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد، به دور از نور، رطوبت و یخ زدگی نگهداری نمایید.

پس از هر بار مصرف، درب بطری فرآورده را محکم ببندید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

سایر ترکیبات:

سیتریک اسید، پروپیلن گلاایکول، سوکرالوز، گلیسرین، سوربیتول ۷۰ درصد، سدیم بنزوات، زانتان گام، ریوفاوین، رنگ قرمز، آب خالص، اتانول.

استاندارد شده بر حسب هدراکوزید سی، هر ۵ میلی لیتر شربت حاوی ۳/۸ میلی گرم هدراکوزید سی می باشد.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: آبان ۱۴۰۳