

هر پیمانه (۵ میلی لیتر) از شربت ۱۵۰ میلی لیتری ویتابی، حاوی ۶ میلی گرم تیامین (ویتامین B_۱)، ۲/۴ میلی گرم ریوفلاوین (ویتامین B_۲)، ۲/۴ میلی گرم پیریدوکسین (ویتامین B_۶)، ۲۴ میلی گرم نیاسین آمید (ویتامین B_۳) و ۳/۶ میلی گرم پانتوتنیک اسید (ویتامین B_۵) می باشد که در جعبه های یک عددی همراه با پیمانه و برگه راهنمای مصرف فرآورده عرضه می شود.

بیماری های چون ببری ببری، آریوفلاوینوزیس (ببروز زخم های دهانی به علت کمبود ویتامین ب ۲)، التهاب زبان و لب و هم چنین بیمار پلاگر ناشی از کمبود ویتامین های خانواده ب می باشند.

هم چنین در بیماران مبتلا به سلیاک، افراد دارای رژیم های غذایی خاص، افراد با اشتها پایین و یا افرادی که بعد از درمان طولانی مدت آنتی بیوتیک دچار اسهال گشته اند، مصرف ویتامین های های گروه ب در جهت کمک به تامین ویتامین های از دست رفته، کمک کننده می باشند.

این فرآورده با دارا بودن ویتامین های ب ۱، ب ۲، ب ۳، ب ۵ و ب ۶ می تواند در کمک به تامین ویتامین های گروه ب، در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر فرآورده را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل است:

کمک به تامین ویتامین های گروه ب:

کودکان ۵-۱ سال: ۲/۵ میلی لیتر روزانه.

کودکان ۱۷-۶ سال: ۵-۲/۵ میلی لیتر روزانه.

بزرگسالان: ۱۰-۵ میلی لیتر روزانه.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به ویتامین ها یا هر یک از اجزای فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

در صورت ابتلا به اختلالات کبدی و زخم فعال معده در مورد مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

موارد احتیاط:

این فرآورده در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

در افراد مبتلا به دیابت، نقرس و بیماری های کبدی

در افرادی که داروهای لوودوپا و فنی توئین مصرف می کنند.

تداخل های دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) نگه دارید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع، متوقف یا تغییر ندهید. نمک های کلسیم، کلرامفنیکل، کلشی سین، اتورواستاتین، رزوواستاتین، سیمواستاتین، لوودوپا، فنی توئین.

نحوه صحیح مصرف فرآورده:

این فرآورده را همراه با غذا و یک لیوان پر از آب مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکمی، سوزش سر دل، اختلال عملکرد کبدی، راه رفتن نامتعادل، بی حسی انگشتان، کاهش حس لامسه، کاهش دمای بدن، لرزش بدن، واکنش های حساسیت به نور، ناهماهنگی عضلات بدن، احتمال زرد رنگ تر شدن ادرار، احساس گرمی، ضعف بدن، تعریق، بی قراری، سیانوز، ادم ریه، خونریزی داخل معده، کلاپس قلبی-عروقی، واکنش های حساسیتی (شوک آنافیلاکتیک، راش پوستی، خارش، کهیر و...).

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائم مسمومیت سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

فرآورده را در بسته بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: مهر ۱۴۰۴