

**تداخلات دارویی:**

اصلی ترین تداخل گزارش شده برای دایمتیکون، اتصال فیزیکی به سایر داروها و کاهش جذب و فراهمی زیستی آن ها می باشد. مصرف همزمان لووتیروکسین و دایمتیکون ممکن است جذب لووتیروکسین را مختل کرده و اثربخشی آن را کاهش دهد. بنابراین توصیه می شود به منظور کاهش احتمال تداخل، لووتیروکسین و دایمتیکون حداقل با ۴ ساعت فاصله زمانی مصرف شوند.

عوارض جانبی:

هر دارو در کنار اثرات درمانی خود ممکن است باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته ای نیز گردد، اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد، ممکن است لازم باشد پزشک مقدار داروی مصرفی را کاهش دهد و یا درمان را متوقف کند.

بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به اینکه دایمتیکون فعال شده جذب سیستمیک ندارد، احتمال عوارض جانبی یا مصرف این دارو بسیار کم است و معمولاً عارضه خاصی گزارش نشده است. با این حال، در صورت مشاهده علائم واکنش آلرژیک از جمله کهیر، مشکل در تنفس یا تورم صورت، لبها، زبان یا گلو، باید فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

**ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: آذر ۱۴۰۴**

هر قرص دای کولیک حاوی ۱۲۵ میلی گرم دایمتیکون فعال شده می باشد که در بلیسترهای ۱۰ عددی و جعبه های ۳۰ عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

- * وجود هر گونه حساسیت
- * بارداری و یا شیردهی
- * ابتلا به بیماری های دیگر

دسته دارویی:

داروهای گوارشی و ضد نفخ

مکانیسم اثر:

دایمتیکون فعال شده به عنوان عامل ضد کف، با کاهش کشش سطحی حباب های گاز در دستگاه گوارش، باعث ناپایداری و ادغام حباب های کوچک شده و در نهایت منجر به آزادسازی و دفع آسان تر گاز می شود.

موارد و مقدار مصرف دارو:

-بهبود علائم ناشی از احتباس گاز در سیستم گوارشی و نفخ: کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۱۲۵-۴۰ میلی گرم ۴ بار در روز در صورت نیاز بعد از وعده غذایی و قبل از خواب (حداکثر دوز مجاز مصرف روزانه: ۵۰۰ میلی گرم)

نحوه مصرف:

دارو را به طور کامل جویده و سپس بلع کنید.

موارد منع مصرف:

-در صورت حساسیت به دایمتیکون

هشدارها و احتیاطات مصرف:**بارداری و شیردهی:**

با توجه به عدم جذب سیستمیک دایمتیکون، می توان این دارو را در دوران بارداری و شیردهی تنها تحت نظر پزشک مصرف نمود.