

**موارد احتیاط:**

در صورتی که وضعیت شما بعد از مصرف دارو بهتر نشد، حتماً به پزشک مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد.

لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) تهیه نمایید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع یا متوقف نکنید و از تغییر میزان مصرف آنها خودداری کنید.

سایمیتیکون باعث کاهش جذب داروهای تیرئوئیدی مانند لووتیروکسین می شود و باید چهار ساعت قبل یا بعد از مصرف این دارو استفاده شود.

عوارض جانبی دارو:

مصرف این دارو معمولاً با عارضه جانبی همراه نمی باشد، اما در صورت بروز اثرات غیر معمول با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

بروز واکنش های آلرژیک جدی نسبت به این دارو نادر می باشد اما در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

راش های پوستی، خارش، تورم صورت و زبان، وجود مشکل در تنفس

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را از بسته بندی اصلی خارج ننمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: مهر ۱۴۰۴

هر قرص جویدنی دای کولیک® حاوی ۴۰ میلی گرم ماده مؤثره سایمیتیکون (دایمیتیکون فعال شده) می باشد که در جعبه های حاوی ۱۰ پلیسه کمتر ۱۰ عددی، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه میشود:

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا به توصیه دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع رسانی نمایید.

• وجود هرگونه حساسیت به دارو

• بارداری و یا شیردهی

• ابتلا به بیماری های دیگر

• استفاده از سایر داروها

موارد و مقدار مصرف دارو:

قرص دای کولیک® به رف علائم گوارشی ناشی از احتباس گاز در معده و روده، از جمله احساس نفخ و احساس پر بودن شکم کمک می کند.

در صورتی که این دارو را به پزشک برای شما تجویز کرده است، آن را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید. در غیر این صورت مقدار و نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۱۲ سال سن: ۱ الی ۲ عدد قرص چهار بار در روز (حداکثر دوز روزانه ۳۶۰ میلی گرم)

کودکان ۲ الی ۱۲ سال: ۱ عدد قرص چهار بار در روز

نحوه مصرف:

قبل از بلعیدن، قرص را کاملاً بجوید یا خرد نمایید.

- دارو را بعد از غذا و یا زمان خواب مصرف نمایید.

- در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف این نوبت خودداری کنید و برنامه معمول دارویی خود را ادامه دهید و مقدار مصرف را دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به سایمیتیکون یا سایر اجزای تشکیل دهنده این قرص

مصرف در بارداری و شیردهی:

- با توجه به عدم جذب داروی سایمیتیکون از دستگاه گوارش، مصرف آن در دوران

بارداری و شیردهی مجاز می باشد.