

Scored Tablet Aciclovir

قرص خط دار آسیکلوویر

قرص آسیکلوویر در دو دوز ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می‌شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع‌رسانی کنید:

- وجود هر گونه حساسیت
- بارداری و یا شیردهی
- استفاده از سایر داروها
- ابتلا به بیماری‌های دیگر

دسته دارویی:

ضد ویروس

مکانیسم اثر:

آسیکلوویر و متابولیت‌های آن مانع ساخت محتوای ژنتیکی ویروس شده و از تکثیر ویروس جلوگیری می‌کنند.

موارد و مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان:

هرپس زوستر (زونا):

۸۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت در زمان بیداری (۵ بار در روز) به مدت ۷ روز (در صورت بروز اولین علائم درمان آغاز می‌شود. اثربخش‌ترین زمان درمان در طی ۷۲ ساعت ابتدایی شروع علائم می‌باشد).

هرپس سیمپلکس (تیخال) دستگاه تناسلی:

۲۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت در زمان بیداری (۵ بار در روز) به مدت ۱۰-۷ روز

- در بیماران با اپیزودهای عود مجدد بیماری:

۴۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز به مدت ۵ روز

(بهترین زمان شروع درمان، در طی ۲۴ ساعت ابتدایی شروع علائم می‌باشد)

- سرکوب مزمن بیماری در صورت عودهای مکرر و شدید:

۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۱۲ ماه

واریسلا (آبله مرغان):

بهترین زمان شروع درمان، در طی ۲۴ ساعت ابتدایی شروع علائم می‌باشد. ممکن است در بیماران زخم‌های فعال، درمان دیرتر آغاز شود.

۸۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت در زمان بیداری (۵ بار در روز) به مدت ۷-۵ روز و تا زمان

بهبودی زخم‌ها

تبخال دهانی:

۴۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز به مدت ۱۰-۵ روز تا رفع تمامی زخم‌ها (بهتر است درمان با شروع اولین علائم بیماری آغاز گردد).

کودکان:

پیشگیری از عفونت ویروسی سائیتوگال:

- نوزادان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۴۰ کیلوگرم: ۶۰۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع بدن در هر دوز به صورت ۴ بار در روز (حداکثر دوز مجاز مصرفی: ۸۰۰ میلی گرم در هر دوز می‌باشد)

- کودکان و نوجوانان بیش از ۴۰ کیلوگرم: ۸۰۰ میلی گرم ۴ بار در روز

هرپس زوستر:

درمان سرپایی کودکان بالای ۱۲ سال و نوجوانان: ۸۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت (۵ بار در روز) به مدت ۷-۵ روز

نحوه مصرف:

- همراه با دارو مقدار کافی آب بنوشید.

- دارو را به طور کامل بلعیده و از جویدن و یا خرد کردن آن خودداری کنید.

- آسیکلوویر را می‌توان همراه و یا بدون غذا مصرف نمود.

- در صورتی که مصرف یک دوز از دارو را فراموش کرده‌اید، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. در صورت فراموشی زمان دوز بعدی، دارو را طبق برنامه مصرف نمایید و از دو برابر کردن مقدار مصرفی جهت جبران دوز از یاد رفته، پرهیز کنید.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به آسیکلوویر

هشدارها:

- در بیماران با نارسایی شدید کبدی با احتیاط مصرف گردد.

- آسیکلوویر ممکن است با ایجاد کربستال در مجاری ادراری موجب آسیب حاد کلیوی از جمله بروز نفروپاتی انسدادی، نفرت بینایی و نکروز توبولار کلیوی گردد.

- آسیب کلیوی در اکثر موارد پس از کاهش دوز و یا قطع دارو، رفع می‌گردد.

- آسیکلوویر می‌تواند موجب اختلال در سیستم عصبی و بروز علائمی مانند گیجی، بی‌قراری و اضطراب، بی‌حالی، تهوع و اختلالات شناختی شود.

- میکرو آنژیوپاتی ترومبوتیک (بروز لخته در عروق کوچک خونی): این عارضه شامل ترومبوتیک ترومبوسیتونی پورپوره و سندرم اورمیک همولیتیک می‌باشد. این عوارض می‌توانند موجب آسیب به مغز، کلیه، کبد، پانکراس و قلب شوند. با قطع دارو درمانی و

درمان حمایتی مناسب، علائم بهبود می‌یابد.

– در کودکان مبتلا به بیماری واریسلا که بیماری زمینه‌ای ندارند، مصرف خوراکی آسیکلوویر توصیه نمی‌شود. با این حال، بیماران در معرض خطر متوسط تا شدید (از جمله کودکان بالای ۱۲ سال، افراد مبتلا به اختلالات مزمن ریه و پوستی، و یا بیمارانی که به طولانی مدت از سالیسیلات‌ها مصرف می‌کنند)، تجویز آسیکلوویر در صورت ابتلا به واریسلا ممکن است مد نظر قرار گیرد.

– در صورت ضعف سیستم ایمنی مانند ابتلا به بیماری HIV و یا سابقه پیوند مغز استخوان، قبل از مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

احتیاط مصرف:

مصرف این دارو در بیماران زیر باید با احتیاط و تحت نظر پزشک صورت گیرد:

– افراد بالای ۶۵ سال

– بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی

– بیماران مبتلا به پرفشاری خون

– بیماران مبتلا به دیابت

– بیماران با اضافه وزن

– بیماران دریافت کننده دوزهای بالای آسیکلوویر

– در صورت مصرف همزمان با داروهایی مانند داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)، وکوماپسین و سایر داروهای با سمیت کلیوی.

بارداری:

این دارو از جفت عبور می‌کند. بر اساس مطالعات انجام شده، آسیکلوویر در ۳ ماهه نخست بارداری موجب آسیب به جنین نمی‌شود. با این حال، آسیکلوویر در دوران بارداری می‌بایست تنها در صورت ضرورت و زیر نظر پزشک مصرف شود.

شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. مادران مبتلا به ویروس تبخال که جهت درمان، آسیکلوویر مصرف می‌کنند می‌توانند ضمن رعایت بهداشت کامل، تا زمان بروز زخم بر روی سینه به شیردهی ادامه دهند. در صورت بروز تظاهرات پوستی نزدیک و یا روی سینه، توصیه می‌شود از شیردهی تا زمان بهبود زخم‌ها پرهیز کنند.

تداخل دارویی:

– فوسکارنت، زیدوودین، تنوفویر

– کالادبین، مایکوفنولات موفتیل

– تیزانیدین

– واکسن واریسلا زوستر (۲۴ ساعت قبل از تزریق واکسن و تا ۱۴ روز بعد از واکسناسیون، از مصرف آسیکلوویر خودداری کنید).

– واکسن زوستر (آسیکلوویر ممکن است اثرات درمانی این واکسن را کاهش دهد).

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، می‌تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته‌ای نیز گردد. اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد پزشک مقدار داروی مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند. لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده است:

– خیلی شایع (بیش از ۱۰ درصد):

کاهش سطح هموگلوبین، کاهش تعداد نوتروفیل‌ها، بی‌حالی و ضعف

– شایع (۱۰-۱ درصد):

کفیر، راش پوستی، خارش، کاهش تعداد پلاکت‌های خون، تهوع، استفراغ، اسهال، افزایش میزان بیلی روبین سرم، افزایش میزان ترانس آمینازهای سرم، سردرد، افزایش میزان نیتروژن اوره خون، افزایش کراتینین سرم

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضای آن، مصرف نکنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران – ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: آبان ۱۴۰۴

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پنجمین پست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۷۱۶۵۱۲ | تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۴۳۱۳-۱۷
info@kharazmipharm.com | www.kharazmipharm.com

شرکت داروسازی
خوارزمی