

دیکلوفناک سدیم

Diclofenac Sodium

دو برابر کردن دوز مصرفی برای جبران نوبت فراموش شده بپرهیزید.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به دیکلوفناک سدیم یا سایر اجزا محصول
- سابقه آسم، کهیر یا سایر واکنش‌های آلرژیک به دنبال مصرف آسپرین یا سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
- بیماران مبتلا به خونریزی فعال دستگاه گوارش یا زخم معده فعال یا سابقه زخم یا خونریزی مکرر گوارشی
- شرایط جراحی بای‌پس عروق کرونری (CABG)
- سه ماهه سوم بارداری

هشدارها و احتیاطات مصرف:

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایند و از مصرف بیش از اندازه مجاز بپرهیزید.

- در صورتی که سابقه حساسیت به آسپرین یا سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی را دارید می‌بایست از مصرف دیکلوفناک بپرهیزید.
- در صورت مشاهده علائم واکنش آلرژیک به دیکلوفناک، فوراً به مراکز درمانی مراجعه نمایید. این علائم می‌تواند شامل کهیر، دشواری در تنفس، یا تورم صورت و گلو باشد. همچنین در صورت بروز واکنش‌های شدید مانند سوزش چشم‌ها، زردی پوست و چشم‌ها، بثورات پوستی قرمز یا بنفش همراه با تاول و پوسته‌ریزی، مصرف دارو را قطع کرده و فوراً مراقبت‌های پزشکی دریافت کنید.
- پیش از مصرف دارو در صورت ابتلا به بیماری‌های قلبی و فشار خون بالا، سابقه زخم یا خونریزی گوارشی، آسم، بیماری‌های کبدی یا کلیوی و یا در صورت مصرف سیگار، پزشک معالج خود را مطلع سازید.
- اگر داروی ضد افسردگی می‌کنید، قبل مصرف دیکلوفناک با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمایید. مصرف برخی از داروهای ضد افسردگی با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند دیکلوفناک می‌تواند ریسک عوارض جانبی گوارشی و خونریزی را افزایش دهد.

- دیکلوفناک می‌تواند خطر بروز حمله قلبی را افزایش دهد؛ بنابراین از مصرف این دارو بلافاصله قبل یا بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر قلب (CABG) خودداری نمایید.

- داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی می‌توانند باعث خونریزی گوارشی شوند. این عوارض ممکن است بدون هیچ علامت هشداردهنده و در طول مصرف دارو رخ دهند و در شرایطی منجر به مرگ شوند. بیماران سالمند و افرادی که سابقه ابتلا به زخم معده و یا خونریزی گوارشی را دارند، بیشتر در معرض خطر هستند و

هر قرص از این دارو، حاوی ۱۰۰ میلی گرم دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش می‌باشد که در پلیسه‌های ۱۰ عددی و جعبه‌های ۳۰ عددی همراه با پرچه راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می‌شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری ننمایید. قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج یا دکتر داروساز خود اطلاع‌رسانی کنید:

- وجود هر گونه حساسیت
- استفاده از سایر داروها
- بارداری یا شیردهی
- ابتلا به بیماری‌های دیگر

دسته دارویی:

دیکلوفناک جزء دسته داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) طبقه‌بندی می‌شود.

مکانیسم اثر:

دیکلوفناک از طریق مهار برگشت‌پذیر آنزیم‌های سیکلواکسیژناز نوع ۱ و ۲ (COX-1 و COX-2) عمل می‌کند. این آنزیم‌ها در تبدیل اسید آراشیدونیک به پروستاگلاندین‌ها نقش دارند؛ پروستاگلاندین‌ها واسطه‌های اصلی ایجاد التهاب، درد و تب هستند. با کاهش سنتز پروستاگلاندین‌ها، دیکلوفناک موجب کاهش التهاب، تسکین درد و کاهش تب می‌شود.

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف قرص دیکلوفناک سدیم با توجه به شرایط بیمار توسط پزشک معالج تعیین می‌گردد، اما به طور کلی میزان مصرف معمول این دارو برای بزرگسالان به شرح زیر است:

تسکین علائم استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید:

۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز.

حداکثر دوز مجاز روزانه: ۱۰۰ میلی گرم دوبار در روز برای بیماران خاصی که فواید مصرف قرص بر عوارض آن غلبه دارد.

نحوه مصرف:

دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا یا یک لیوان آب مصرف نمایید. دارو را به طور کامل بلعیده و از جویدن یا خرد کردن آن خودداری نمایید. چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید، اما اگر به نوبت بعدی نزدیک بود، از مصرف آن خودداری کنید. از

می‌بایست پیش از مصرف دارو با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمایند.

- مصرف این دارو می‌تواند تجمع پلاک‌ها را کاهش دهد و زمان خونریزی را طولانی‌تر کند.

- مصرف طولانی مدت داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی می‌تواند منجر به بروز آسیب کلیوی شود. سالمندان، مبتلایان به نارسایی قلبی، اختلال عملکرد کلیوی و یا کبدی بیشتر در معرض این عوارض هستند و می‌بایست با احتیاط مصرف شود.

گزارش عوارض دارویی (فارماکوپزیلانس):

شما می‌توانید در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی که در برگیرنده اهنما ذکر شده یا نشده است با پزشک معالج یا داروساز خود صحبت نمایید و از طریق روش‌های زیر اطلاع‌رسانی کنید:

سایت شرکت بخش گزارش عوارض دارویی

www.kharazmipharma.com

- تلفن شرکت داخلی واحد پشتیبانی بیمار

گزارش عوارض جانبی شما می‌تواند به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد ایمنی این دارو کمک زیادی نماید.

بارداری و شیردهی:

دیکلوفناک در دوران بارداری و شیردهی تنها زیر نظر پزشک متخصص تجویز می‌گردد. مصرف آن در سه ماهه سوم بارداری توصیه نمی‌شود.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد و یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می‌کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) را تهیه کرده و آن را با پزشک یا داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع یا متوقف نکنید و یا تغییر ندهید.

آسپرین، سلکوکسیب، ایبوپروفن، ایندومتاسین، کتورولاک، ملوکسیکام، فنمایدیک اسید، ناپروکسن، پیروکسیکام، متوروکسات، لیتیم کربنات، دولوکستین، ونافاکسین، فلوکستین، سیتالوپرام، اس سیتالوپرام، سرتالین، لوزارتان، تلمیزارتان، والزارتان، متوپرولول، سوتالول، اتاناپریل، آپیکسابان، ویرابو کسبابان، انوکسپارین، هپارین، کلوییدوگرل، تیکارگورل، وارفارین، دابیگاتران، دیگوکسین، دیلتیازم، هیدروکلروتیازید، ریفامپین، سیرولیموس، تاکرولیموس، والاسیکلوویر، لفلونامید، کتوکونازول، وریکونازول، پمِدِنی-زولون، کاربامازپین، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، می‌تواند باعث بروز عوارض جانبی

ناخواسته‌ای نیز گردد. اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد پزشک مقدار داروی مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند. لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده است. در صورت بروز هر یک از موارد زیر، مصرف دارو را قطع کرده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

مشاهده اولین نشانه‌های راش پوستی، علائم شبه آنفلوآنزا، تورم اندامها، افزایش سریع وزن، احساس تنگی نفس، کاهش یا قطع ادرار، درد و سوزش هنگام ادرار، درد ناحیه فوقانی و راست شکم، تیرگی ادرار یا یرقان (زردی پوست یا چشم‌ها)، مدفوع خونی یا سیاه‌رنگ، سرفه همراه با خون.

عوارض جانبی شایع دیکلوفناک شامل موارد زیر می‌باشد:

سوءهاضمه، نفخ، تهوع، اسهال، یبوست، زخم و خونریزی گوارشی، راش پوستی، خارش پوست، ووزر گوش، نارسایی قلبی، سمیت کبدی، سمیت کلیوی، آنمی، هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه، خواب‌آلودگی، خارش یا تحریک، گرفتگی بینی، افزایش فشار خون، تورم یا درد اندامها.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو، سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. حتماً جعبه دارو را نزد خود داشته باشید و به پزشک نشان دهید و او را آگاه سازید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را در بسته‌بندی اصلی خود و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته پرهیزید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از دکتر داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۴۰۵

شرکت داروسازی
خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
بن بست داروسازی خوارزمی، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۰۲۱-۳۴۵۴۱۲-۱۷ تلفن: ۱۳۸۹۱۶۵۱۲
info@kharazmipharma.com www.kharazmipharma.com