

مطلع نمایید:

آئمی همولیتیک، هموگلوبینوپاتی، آپلازی گلبول قرمز، هموسیدروزیس، اختلالات خونی، اختلالات متابولیسمی خاص و آئمی پرنشبیوز (فقر ویتامین ب۱۲)

از مصرف همزمان با لبنیات، چای و قهوه خودداری شود.

پس از بهبود علائم آزمایشگاهی کم خونی، جهت پر کردن ذخایر آهن بدن بنا به تجویز پزشک مصرف فرآورده ۳ الی ۶ ماه ادامه می یابد.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک معالج خود را مطلع سازید:

فنی توئین، کلرامفنیکل، متیل دوبا، لودوپا، لووتیروسکین، انواع آنتی بیوتیک ها شامل (تتراسیکلین ها، کینولون ها)، کلسیم-تیرامین، پنی سیلایم، متوتروکسات، بیسفسوفونات ها، سایر مکمل های حاوی کلسیم و زینک، آنتی اسید های معده.

عوارض جانبی دارو:

یبوست، ناراحتی معده، اسهال، سیاه شدن رنگ مدفوع، واکنش های آلرژیک (خارش، راش پوستی، تورم، ادم و مشکل تنفس)

شرایط نگهداری:

- فرآورده را در محل خشک و خنک، دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: اردیبهشت ۱۴۰۵

این فرآورده به شکل کپسول خوراکی حاوی ۲۸ میلی گرم آهن (به صورت ملح فروس بیسگلیسینات)، ۴۰۰ میکرو گرم فولیک اسید، ۸ میکرو گرم ویتامین ب۱۲ و ۶۰ میلی گرم ویتامین ث می باشد، که در شرکت داروسازی خوارزمی تولید و در پلیسترهای ۱۵ عددی بسته بندی شده و به بازار عرضه میشود.

موارد مصرف:

این محصول مناسب در دوران بارداری، شیردهی و کم خونی ناشی از کمبود آهن، اسید فولیک و ویتامین ب۱۲ می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

بزرگسالان: روزانه ۱ عدد کپسول ترجیحا با معده خالی و در صورت عدم تحمل همراه با غذا با یک لیوان آب خنک میل شود. در صورت نیاز به مقادیر بیشتر، با پزشک خود مشورت نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به ویتامین ها یا هر یک از اجزای فرآورده.

- دریافت کنندگان متناوب خون

- هموکروماتوزیس

مصرف در بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با پزشک معالج مشورت نمایید.

هشدارها:

-از مکیدن یا جویدن کپسول بعثت امکان ایجاد زخم، تحریک دهانی و تغییر رنگ دندانها خودداری شود.

موارد احتیاط:

-در صورت ابتلا به بیماری های ذیل قبل از مصرف پزشک معالج خود را