

هر پیمانه (۵ میلی لیتر) از شریت نوریز کاف[®]، حاوی ۱۶۰ میلی گرم استامینوفن، ۱ میلی گرم کلرفنیرامین مالئات، ۲/۵ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید و ۵ میلی گرم دکسترومتورفان هیدروبروماید می باشد، که در جعبه های یک عددی همراه با پیمانه و راهنمای مصرف دارو عرضه می شود.

موارد و مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

درمان تب، گلودرد، آبریزش، احتقان بینی و سرفه:

کودکان ۱۲-۶ سال: ۱۰ میلی لیتر هر ۶-۴ ساعت.

کودکان ۱۲ سال به بالا و بزرگسالان: ۲۰ میلی لیتر هر ۶-۴ ساعت.

راهنمایی های عمومی:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران، خودداری نمایید.

- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی و خواب آلودگی گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

- در صورت عدم بهبودی علائم بیماری پس از ۷ روز از شروع درمان یا در صورت وجود تب، سردرد، سرفه یا خارش های پوستی به پزشک مراجعه کنید.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به استامینوفن، کلرفنیرامین، فنیل افرین، دکسترومتورفان یا هر یک از اجزای دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن؛ کلرفنیرامین؛ فنیل افرین و دکسترومتورفان در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت مصرف همزمان با داروهای MAOIs (ترانیل سیپرومین، فنلژین، ایزو کربوکسازید) یا تا ۱۴ روز بعد از قطع مصرف MAOIs در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- در خانم های شیرده، نوزادان تازه به دنیا آمده یا نبالغ، در افراد با گلوکوم زاویه بسته، بیماران مبتلا به آسم، افراد با هیپرتروفی پروستات در مورد مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- این دارو در دوران بارداری با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

- از مصرف این دارو در دوران شیردهی خودداری نمایید.

هشدارها:

- در صورت بدتر شدن علائم بیمار و یا به وجود آمدن علائم جدید، تورم و قرمزی در نواحی مختلف بدن، ادامه تب پس از ۳ روز از مصرف دارو، ادامه درد پس از ۱۰ روز از مصرف دارو در بزرگسالان، ۵ روز در کودکان و ۳ روز در نوزادان و در کودکانی که جهت درمان گلودرد استامینوفن مصرف می کنند، باقی ماندن گلودرد کودک برای بیش از ۲ روز همراه با تب، قرمزی، سردرد، تهوع و استفراغ؛ سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

- در صورت بروز هر گونه واکنش حساسیتی پوستی شدید در حین مصرف این دارو، سریعاً دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

- در صورت مصرف همزمان این دارو با کلستیرامین، کلستیرامین را حداقل یک ساعت بعد از مصرف این دارو مصرف کنید.

- از مصرف این دارو بیش از ۷ روز خودداری نمایید.

موارد احتیاط:

این دارو در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

- در افرادی که بیشتر از ۳ ماه الکل مصرف می کنند به علت ریسک تخریب کبدی

- در افراد دچار نقص آنزیم G6PD

- در افراد با اختلال سوء جذب مزمن

- در بیماران با اختلال شدید کلیوی

- در بیماران با اختلال عملکرد کبدی یا بیماری فعال کبدی

در بیماران با اختلال تیروئید، مبتلا به دیابت
- در افراد مبتلا به بیماری های قلبی-عروقی (افراد با بیماری عروق کرونر، بالا بودن فشار خون، بیماری عروق محیطی)

در افراد با افزایش فشار داخل چشم یا گلوکوم
در کودکان با آتوپی

در بیماران با مشکلات دفع ادراری به علت بزرگ شدن غده پروستات و هیپرپلازی پروستات
در سالمندان بالای ۶۰ سال، زیرا سالمندان نسبت به عوارض این دارو حساس تر هستند. عوارضی مثل: توهم، تشنج، یبوست، خشکی دهان، گیجی و...

در افراد با بیماری های دستگاه تنفسی تحتانی مثل: آمفیزم، برونشیت مزمن و آسم، زیرا این افراد به عوارض آنتی کولینرژیک این دارو (خشکی دهان و غلیظ تر شدن ترشحات تنفسی) حساس تر هستند.
در افراد با انسداد معده و دودنوم

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
لینزولید، متیل دوبا، TCAs، MAOIs (آمی تریپتیلین، نور تریپتیلین، کلومیپرامین، ایمی پرامین، دوکسپین)، الکل، باریتورات، بوسلفان، کاربامازپین، کلستیرامین، داپسون، ایمانتینیب، ایزونیازید، لاموتریزین، نیتریک اکساید، پرلوکائین، پروبنسید، نیتريت سدیم، وارفارین، آمفتامین، اپیوئید، آریپیپرازول، آزلاستین (بینی)، بتا هستین، بریمونیدین (موضعی)، بوپرنورفین، گلوکاغون، هیدروکدون، هیدروکسی زین، ایپراتروپیوم (استنشاقی)، منیزیم سولفات، میرتازاپین، پتاسیم کلراید، پرامی پکسلول، فورزاید، روپینیرول، SSRIs، تیوریدازین، تیوتروپیوم، توپیرامات، زولپیدم، پگ اینترفرون آلفا 2b، اندانسترون، گرانیسترون، داپوکستین، ممانتین، متیلان، متوکلوپرامید، کینیدین، SSRIs، ترامادول.

نحوه صحیح مصرف دارو:

دارو را می توان همراه یا بدون غذا مصرف نمود، در صورت بروز عارضه گوارشی، می توان دارو را همراه با غذا مصرف نمود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
راش پوستی، کاهش بیکربنات سدیم خون، کاهش سطح کلسیم و سدیم سرم، افزایش اوره خون، افزایش گلوکز سرم، آنمی، لوکوپنی، نوتروپنی، افزایش آلکالین فسفاتاز سرم، افزایش بیلی روبین سرم، اگرانولوسیتوز، آریتمی، تپش قلب، افزایش یا کاهش ضربان قلب، افزایش فشار خون گذرا، سردرد، احساس سبکی سر، سرگیجه، لرزش بدن، بی خوابی، عصبی شدن، بی قراری، ضعف، تهوع، احتباس ادرار در افراد با هیپرتروفی پروستات، دیس تونی عضلات، تعریق، تغییرات ECG قلب، تشنج، خواب آلودگی، توهم، کابوس شبانه، افزایش وزن، ژنیکوماستی، بی اشتها، یبوست، طعم تلخ در دهان، تاری دید، درد چشم، وزوز گوش، اختلال دید، اسهال، آنمی آپلاستیک، آبسه، ادم، آبریزش چشم، تحریک پذیری، سندرم سروتوئین.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ی امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت محیط زیست می نماید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران- ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: مهر ۱۴۰۳