

Rhinoriz®
NASAL Spray
Allerzam F®
Azelastine 137+Fluticasone 50

راحتی خارج می شود و مه یکنواختی را ایجاد می کند. پس از انجام این مراحل، دارو آماده مصرف می باشد.

- در صورتی که دارو به مدت ۱۴ روز یا بیشتر استفاده نشده باشد، قبل از استفاده می بایست مراحل آماده سازی ظرف محتوی دارو را مجدداً انجام دهید.

- بینی خود را پیش از استفاده تمیز نمایید.

- جهت استفاده از اسپری لازم است در حالت نشسته و یا ایستاده قرار بگیرید. نوک اسپری را داخل سوراخ بینی قرار داده و سر را به جلو خم کنید. سوراخ دیگر بینی را با انگشت خود ببندید. همزمان با اسپری کردن دارو، از طریق بینی نفس بکشید.

- از اسپری کردن مستقیم دارو به دیواره داخل بینی، دهان و چشم خودداری نمایید.

- پس از هر بار استفاده، نوک اسپری را به وسیله دستمال کاغذی تمیز نمایید و سپس درپوش اسپری را بر روی آن قرار دهید.

- در صورتی که مصرف یک دوز از دارو را فراموش کرده اید و در فاصله زمانی کم به یاد آورده اید، هرچه زودتر دارو را مصرف نمایید. در صورتی که زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است، دارو را طبق روال گذشته مصرف کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرفی جهت جبران دوز از یاد رفته خودداری کنید.

- بدون مشورت با پزشک، مقدار مصرف دارو را تغییر ندهید و مصرف آن را قطع نکنید.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به آزلاستین هیدروکلراید، فلویتیکازون پروپیونات و یا سایر اجزا محصول.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان کمتر از ۶ سال به اثبات نرسیده است.

- در طول مصرف این دارو ممکن است علائمی مانند خستگی، بی حالی، سرگیجه یا احساس ضعف بروز نماید. این علائم می توانند ناشی از خود بیماری نیز باشند. در چنین شرایطی می بایست از رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، پرهیزید.

- از مصرف فرآورده های حاوی الکل و سایر داروهایی که باعث خواب آلودگی می شوند، خودداری نمایید.
 - از اسپری کردن دارو به داخل چشم ها خودداری نمایید. در صورت تماس تصادفی با چشم، آن ها را حداقل به مدت ۱۰ دقیقه با آب شستشو دهید.

- ممکن است طی دفعات اولیه مصرف به علت حساسیت حفره بینی دچار عطسه شوید که با ادامه روند درمانی برطرف خواهد شد.

- بیمارانی که تحت درمان طولانی مدت با

رینوریز®
اسپری بینی
آلرززام اف®
آزلاستین ۱۳۷ + فلویتیکازون ۵۰

این محصول حاوی ۱۳۷ میکروگرم آزلاستین هیدروکلراید و ۵۰ میکروگرم فلویتیکازون پروپیونات در هر دوز (پاف) و مجموعاً ۱۲۰ دوز در هر بطری می باشد که همراه با راهنمای مصرف دارو، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج یا دکتر

داروساز اطلاع رسانی کنید:

- وجود هرگونه حساسیت

- استفاده از سایر داروها

- بارداری یا شیردهی

- ابتلا به بیماری های دیگر

دسته دارویی:

آزلاستین هیدروکلراید جزء دسته دارویی آنتاگونیست گیرنده H1 و فلویتیکازون پروپیونات جزء دسته دارویی کورتیکواستروئیدها می باشد.

مکانیسم اثر:

آزلاستین با مهار اثر هیستامین و کاهش آزادسازی برخی واسطه های التهابی، علائمی مانند عطسه، خارش و آبریزش بینی را کاهش می دهد. فلویتیکازون با مهار سلول های التهابی و مسدود کردن آزادسازی هیستامین، سیتوکین ها و لکوترین ها، التهاب و احتقان بینی را کنترل می کند. اثر همزمان این دو ماده منجر به کنترل سریع تر و مؤثر تر علائم رینیت آلرژیک می گردد.

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو، بر اساس شرایط بیمار توسط پزشک معالج تعیین می گردد. اما مقدار معمول مصرف این محصول به شرح زیر می باشد:

- بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۶ سال مبتلا به رینیت آلرژیک:

یک پاف در هر سوراخ بینی دو بار در روز (صبح و عصر)

نحوه مصرف:

- دارو را در فواصل زمانی منظم و به میزان تجویز شده توسط پزشک استفاده نمایید و از تغییر خودسرانه دوز و مدت زمان مصرف پرهیزید.

- این دارو فقط برای مصرف داخل بینی کاربرد دارد.

- قبل از هر بار مصرف، بطری را به آرامی تکان دهید.

- زمانی که برای اولین بار از این دارو استفاده می نمایید، لازم است ابتدا ظرف دارو را برای مصرف آماده کنید. بدین منظور درپوش اسپری را بردارید و چند مرتبه دارو را در هوا اسپری نمایید تا زمانی که مطمئن شوید دارو از اسپری به

کورتیکواستروئیدها قرار دارند، طبق صلاحدید پزشک می‌بایست از نظر سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) با انجام تست تحریک ACTH یا اندازه‌گیری کورتیزول آزاد ادراری پایش شوند.

- در صورتی که به تازگی دچار زخم تیغه بینی شده‌اید یا اخیراً جراحی بینی یا آسیب‌دیدگی بینی داشته‌اید، توصیه می‌شود تا زمان ترمیم زخم از مصرف کورتیکواستروئیدهای داخل بینی پرهیز نمایید.

- کورتیکواستروئیدها ممکن است سیستم ایمنی بدن را تضعیف کنند و ریسک ابتلا به عفونت‌ها را افزایش دهند. بنابراین توصیه می‌شود در صورت بروز علائم عفونت‌های ویروسی، باکتریایی، قارچی، انگلی یا تبخال چشمی، پزشک خود را مطلع سازید. همچنین، در طول مصرف این دارو از تماس با مبتلایان به بیماری‌های واگیردار خودداری نمایید.

- به هنگام قطع مصرف این دارو، کاهش دوز باید به صورت تدریجی و مطابق اصول قطع مصرف کورتیکواستروئیدهای خوراکی انجام شود.

- در صورت مصرف همزمان با سایر کورتیکواستروئیدها می‌بایست حد مجاز مصرف این دسته دارویی در نظر گرفته شود.

- مصرف همزمان کورتیکواستروئیدهای داخل بینی با سایر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی ممکن است خطر سرکوب محور HPA را افزایش دهد.

گزارش عوارض دارویی (فارماکوویزیلانس):

شما می‌توانید در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی که در برگیرنده‌ها ذکر شده و یا نشده است، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید و از طریق روش‌های زیر اطلاع‌رسانی کنید:

- سایت شرکت بخش گزارش عوارض دارویی www.kharazmipharm.com
- تلفن شرکت داخلی واحد پشتیبانی بیمار
گزارش عوارض جانبی شما می‌تواند به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد ایمنی این دارو کمک زیادی نماید.

بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی در زمینه ایمنی مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی در دسترس نیست؛ بنابراین، در صورتی که در دوران بارداری یا شیردهی هستید یا تصمیم به باردار شدن دارید، قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد و یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می‌کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) را تهیه کرده و آن را با پزشک یا داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع یا متوقف نکنید و یا

تغییر ندهید.

فلوتیکازون پروپیونات از طریق CYP3A4 متابولیزم می‌شود. ریتوناویر و سایر مهارکننده‌های قوی CYP3A4 مانند کنوکونازول می‌توانند غلظت پلاسمایی فلوتیکازون پروپیونات را به طور قابل توجهی افزایش داده و موجب کاهش شدید کورتیزول سرم شوند. مواردی از بروز سندرم کوشینگ و سرکوب آدرنال در مصرف همزمان گزارش شده است. بنابراین مصرف همزمان توصیه نمی‌شود مگر آنکه منافع بالقوه بر خطرات احتمالی برتری داشته باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، می‌تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته‌ای نیز گردد. اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد پزشک مقدار داروی مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند. لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده است.

احساس طعم تلخ در دهان، خشکی دهان، تهوع، عطسه، سردرد، زخم بینی، خشکی و خونریزی بینی، سوراخ شدن تیغه بینی، خواب‌آلودگی، گیجی، سرکوب سیستم ایمنی و افزایش ریسک ابتلا به عفونت‌ها، سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA)، کاهش سرعت ترمیم زخم، گلوکوم، آب مروارید، کاندیدازیس و ابتلا به عفونت‌های قارچی، اختلال در رشد کودکان.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو، سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. حتماً جعبه دارو را نزد خود داشته باشید و به پزشک نشان دهید و او را آگاه سازید.

شرایط نگهداری:

دارو را به صورت ایستاده، به دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید. پس از هر بار مصرف، درپوش را در جای خود قرار دهید. از قرار دادن دارو در یخچال بپرهیزید و از یخ‌زدگی محافظت نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضا آن مصرف نکنید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سؤال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۴۰۵