

نحوه مصرف:

– قبل از مصرف ظرف حاوی دارو را چند مرتبه تکان دهید.

– بینی خود را پیش از استفاده تمیز کنید.

– زمانی که برای اولین بار از این دارو استفاده می کنید، باید ابتدا بطری را برای مصرف آماده کنید. بدین منظور چند مرتبه دارو را در هوا اسپری کنید تا زمانی که مطمئن شوید دارو از اسپری به درستی خارج می شود.

– جهت استفاده از اسپری باید در حال نشسته یا ایستاده قرار بگیرید. نوک اسپری را داخل سوراخ بینی خود قرار داده، سر را کمی به جلو خم کنید. سوراخ دیگر بینی را با دست خود ببوشانید. همزمان با اسپری کردن دارو از طریق بینی نفس بکشید. – از اسپری کردن مستقیم دارو به دیواره داخل بینی، دهان و چشم خودداری کنید.

– بعد از هر مرتبه استفاده از اسپری آن را به وسیله دستمال کاغذی تمیز نمایید.

– پس از استفاده درپوش اسپری را بر روی آن قرار دهید.

موارد منع مصرف:

– در صورت وجود حساسیت به مومتازون فوروات یا سایر اجزای تشکیل دهنده قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورتی که در دوران بارداری یا شیردهی هستید و یا تصمیم به باردار شدن دارید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها:

– در صورت بروز علائم شدید حساسیت به دارو مانند تورم صورت، مشکل در بلع، کهیر، مشکل تنفسی، دارو را قطع و سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

– تجویز طولانی مدت و با دوز بالا در کودکان می تواند موجب کاهش سرعت رشد در آنها شود. به همین علت کودکانی که از این دارو استفاده می کنند باید به طور مرتب از لحاظ سرعت رشد پایش شوند.

اسپری بینی مومتازون فوروات ۰/۰۵ درصد حاوی ۵۰ میکروگرم مومتازون فوروات در هر دوز (پاف) می باشد که، همراه با راهنمای مصرف دارو، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی نمایید:

* وجود هر گونه حساسیت

* بارداری و یا شیردهی

* استفاده از سایر داروها

* ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار و مورد مصرف هر دارو را پزشک با توجه به شرایط هر بیمار تعیین می کند. اما مصرف معمول این اسپری به شرح ذیل است:

پولیپ بینی

بزرگسالان: ۲ پاف در هر سوراخ بینی دو مرتبه در روز اسپری شود. (مجموع دوز روزانه معادل ۴۰۰ میکروگرم می باشد.)

رینیت آلرژیک (فصلی یا دائمی)، گرفتگی بینی ناشی از رینیت آلرژیک فصلی

بزرگسالان: ۲ پاف در هر سوراخ بینی یک مرتبه در روز اسپری شود. (مجموع دوز روزانه معادل ۲۰۰ میکروگرم می باشد.)

کودکان ۲ تا ۱۱ سال: یک پاف در هر سوراخ بینی یک بار در روز (مجموع دوز روزانه ۱۰۰ میکروگرم) کودکان ۱۲ سال و بزرگتر: به میزان دوز تجویزی برای بزرگسالان مراجعه شود.

پیش گیری از رینیت آلرژیک فصلی:

کودکان بزرگتر از ۱۲ سال سن و بزرگسالان: ۲ الی ۴ هفته قبل از شروع فصل گرده افشانی، هر روز دو پاف در هر سوراخ بینی اسپری شود. (مجموع دوز روزانه ۲۰۰ میکروگرم می باشد.)

– قطع این دارو باید به صورت تدریجی و تحت نظر پزشک انجام شود.

– در صورتی که این دارو را به مدت چندین ماه استفاده می کنید برای ادامه مصرف با پزشک معالج خود صحبت کنید.

– در صورتی که به تازگی عمل جراحی بینی انجام داده اید و یا اخیراً خونریزی از بینی و یا ضربه به بینی داشته اید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

– در صورتی که مبتلا به سل ریوی فعال یا نهفته، عفونت هرپس چشمی، و سایر عفونت های قارچی، باکتریایی یا ویروسی درمان نشده هستید قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

– افرادی که دارو را برای مدت طولانی مصرف می کنند و یا طی مصرف دچار تغییراتی در بینایی می شوند باید تحت معاینات چشم پزشکی قرار گیرند.

موارد احتیاط:

قبل از مصرف این دارو وجود هر یک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

– سابقه افزایش فشار داخل چشمی، گلوکوم و کاتاراکت

– ابتلا به اختلال عملکرد کبدی

– مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و یا ابتلا به بیماری های نقص سیستم ایمنی

– ابتلا به سیستمیک فیبروزیس

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها به خصوص داروهای زیر پزشک معالج خود را در جریان بگذارید:

کورتیکواستروئیدهای خوراکی یا تزریقی (مانند دگزامتازون، پردنیزولون)

– داروهایی که برای درمان بیماری ایذرتجویز می شوند مانند ریتوناویر

– داروی سرتینیب

– دسموپرسین

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی می تواند موجب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

ATW.240/LF.01

سردرد، اسهال، حالت تهوع و استفراغ، تنگی نفس، دردهای عضلانی، علائم آسم، برونشیت، سرفه، عطسه، زخم مخاط بینی، گلودرد، کاتاراکت، عفونت فوکانی دستگاه تنفسی، عفونت های ویروسی، عفونت گوش میانی، درد قفسه سینه، علائم شبه آنفلوانزا، سرکوب محور آدرنال-هیپوفیز

شرایط نگهداری:

دارو را ایستاده و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

یک ماه پس از اولین مرتبه بازشدن در بطری، باقیمانده دارو را دور بریزید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

پس از هر بار مصرف درپوش اسپری را در جای خود قرار دهید.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران-ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۴۰۵