

کپسول سیلودوسین

کپسول سیلودوسین در دوزهای ۴ و ۸ میلی گرم در پلیسترهای ۱۰ عددی و جبهه‌های ۳۰ عددی به همراه متن راهنمای مصرف، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می‌شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

– قبل از مصرف دارو باید از به پزشک معالج یا دکتر داروساز اطلاع‌رسانی کنید:

– وجود هر گونه حساسیت

– استفاده از سایر داروها

– بارداری یا شیردهی

دسته دارویی:

آنژاگونیست انتخابی گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک

مکانیسم اثر:

سیلودوسین با مهار گیرنده‌های α_{1A} موجود در عضلات صاف پروستات، موجب شل شدن عضلات مثانه و پروستات می‌شود. در نتیجه، جریان ادرار بهبود یافته و علائم ناشی از بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) کاهش می‌یابد.

موارد و مقدار مصرف دارو:

سیلودوسین می‌بایست با یک فنجان آب سرد به صورت یکبار در روز مصرف شود. مقدار دوز مصرفی، بر اساس شرایط بیمار توسط پزشک معالج تعیین می‌گردد.

– هاپرایز برای خوش خیم پروستات (BPH)

مقدار معمول مصرف سیلودوسین، ۸ میلی گرم یکبار در روز می‌باشد.

در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیوی، دوز دارو ممکن است بر اساس نظر پزشک به ۴ میلی گرم یکبار در روز کاهش یابد.

نحوه مصرف:

دارو را طبق نظر پزشک و همراه با غذا میل نمایید.

– کپسول را به طور کامل به همراه یک لیوان آب ولرم و یا بعد از غذا میل کنید.

– مصرف این دارو ممکن است موجب سرگیجه شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

– در صورتی که مصرف یک دوز دارو را فراموش کرده‌اید، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید. در صورتی که زمان نوبت بعدی نزدیک است، دارو را طبق روال گذشته مصرف کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرفی جهت جبران آن یاد رفته خودداری کنید.

موارد منع مصرف:

– در صورت حساسیت به سیلودوسین یا سایر اجزا محصول

– ناراسایی شدید کلیوی ($CrCl < 30 \text{ ml/min}$)

– ناراسایی شدید کبدی (Child-Pugh بیش از ۱۰)

– مصرف همزمان با مهارکننده‌های قوی آنزیم CYP3A4 یا مهارکننده‌های P-glycoprotein

داروها و احتیاطات مصرف:

– سیلودوسین در سالمندان باید با احتیاط مصرف شود، زیرا خطر بروز افت فشار خون در این گروه بیشتر است.

– در صورت حساسیت به خنک‌ها و کودکان توصیه نمی‌شود.

– در صورت بروز علائمی مانند کپیر، دشواری در تنفس، تورم صورت، لب‌ها، زبان و ... فوراً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

– سیلودوسین به ویژه در شروع درمان می‌تواند موجب سرگیجه شود؛ ممکن است هنگام برخاستن سریع از حالت نشسته ناخوابه، احساس سرگیجه شدیدی داشته باشید.

– هیچ مصرف سیلودوسین بهتر است از نوشیدن آب گرمی قوت خودداری نمایید.

– در بیماران مبتلا به ناراسایی متوسط کلیوی، دوز دارو طبق صلاحیت پزشک باید به ۴ میلی گرم در روز کاهش یابد.

– در بیماران با اختلال خفیف تا متوسط عملکرد کبد، دوز باید زیر نظر پزشک و با احتیاط مصرف شود.

– سیلودوسین می‌تواند روی مردمک چشم تاثیر بگذارد، بیماری که قصد انجام جراحی چشم (مانند آب مروارید) را دارند، باید چشم‌پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازند.

ATW.426/L.F.0

Capsule Silodosin

گزارش عوارض دارویی (فارماکولوژیالاس):

شما می‌توانید در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی که بر برگ راهنما ذکر شده یا نشانه‌ها است با پزشک یا داروساز صحبت نمایید و از طریق روش‌های زیر اطلاع‌رسانی کنید:

– سایت شرکت بخش گزارش عوارض دارویی www.kharazmipharm.com

– تلفن شرکت داخلی واحد پشتیبانی بیمار

– گزارش عوارض جانبی شما می‌تواند به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد ایمنی این دارو کمک زیادی نماید.

بارداری و شیردهی:

سیلودوسین برای مصرف خانم‌ها اندیکاسیون ندارد و تجویز نمی‌شود.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد و یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می‌کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) را تهیه کرده و آن را با پزشک یا داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تایید پزشک، مصرف داروها را شروع یا متوقف نکنید و یا تغییر ندهید.

ایستراکونازول، کلونازول، فلوکونازول، وریکونازول، ریتوناویر، ریتوناویر، تینیدین، کاربامازین، فنوباریتال، فنی توئین، توپیرامات، مایگسیتین، کلاریترومایسین، سیکلوسپورین، متیل پردنیزولون، دکزامتازون، هیدرو کورتیزون، فلوئور کورتیزون، ایزونیازید، متیپازول، نازفادون، نیفیدین، رفامپین، ریگلوپتین، سildenafil، وادفایل، تامسولوسین، تفریو کاست و محصولات گیاهی حاوی St. John's Wort.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، می‌تواند باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته‌ای نیز گردد. اگرچه همه افراد این عوارض را تجربه نخواهند کرد. در برخی موارد ممکن است لازم باشد پزشک مقدار داروی مصرفی شما را کاهش دهد و یا درمان را قطع کند. لیست عوارض جانبی در ذیل شرح داده شده است.

عوارض شایع (بیش از ۱٪):

انزال پس‌رویه (Retrograde Ejaculation): حالتی است که در آن مایع منی هنگام انزال خارج نشده و وارد مثانه می‌شود و می‌تواند بر قدرت باروری آقایان تاثیر بگذارد.

عوارض نسبتاً شایع (۱ تا ۱۰٪):

اسهال، سرگیجه، سردرد، افت فشار خون وضعیتی (شیوع بیشتر در بیماران بالای ۶۵ سال)، سردرد، نازفانژیت، احتقان بینی، یبوی، سینوزیت.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده دارو، سرما به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. حتماً جعبه دارو را نزد خود داشته باشید و به پزشک نشان دهید و او را آگاه سازید.

شرایط نگهداری:

دارو را به دور از نور، گرما و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را بعد از گذشتن تاریخ انقضا آن مصرف نکنید.

هیچ دارویی را از طریق قاضالب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران – ایران

تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: بهمن ۱۴۰۴