

Rhinoriz®
NASAL Spray

Naphazoline

HCl 0.05%

رینوریز®

اسپری بینی

نفازولین

هیدروکلراید ۰/۰۵ درصد

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورتی که در دوران بارداری یا شیردهی هستید، قبل از مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.

هشدارها:

جهت جلوگیری از عارضه احتقان برگشتی، از مصرف دارو بیش از میزان تجویز شده و یا استفاده به مدت طولانی خودداری نمایید.

ممکن است در ابتدای مصرف، این فرآورده باعث ناراحتی موقت از جمله سوزش، عطسه، یا افزایش ترشحات بینی شود.

استفاده بیش از یک نفر از ظرف ممکن است باعث گسترش عفونت شود.

در صورت تداوم و یا بدتر شدن علائم، مصرف دارو را متوقف و با پزشک مشورت نمایید.

موارد احتیاط:

قبل از مصرف این دارو وجود هریک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

• گلوکوم زاویه باز، صدمه چشمی، پرکاری تیروئید، دیابت، فشار خون بالا، بزرگی پروستات

تداخلات دارویی:

تداخلات شدید بین اسپری بینی نفازولین با سایر داروها گزارش نشده است.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در صورت بروز هریک از علائم زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

• عوارض سیستم اعصاب مرکزی مانند اضطراب، سرگیجه، لرزش و غیره

• عوارض موضعی مانند سوزش، خشکی و تحریک ناحیه عطسه

• عارضه احتقان راجعه در صورت استفاده طولانی مدت و بیشتر از میزان تجویز شده

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از بیخ زدگی محافظت نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. پس از هر بار مصرف درپوش اسپری را در جای خود قرار دهید.

هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد نحوه امحاء آن سوال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: فروردین ۱۴۰۵

اسپری بینی نفازولین حاوی ۰.۰۵ گرم نفازولین هیدروکلراید در هر ۱۰۰ میلی لیتر می باشد که در بطری ۱۵ میلی لیتری (هر بطری حاوی ۱۵۰ پاف) به همراه متن راهنمای داخل جعبه، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطلاع رسانی کنید.

• وجود هر گونه حساسیت

• بارداری و یا شیردهی

• استفاده از سایر داروها

• ابتلا به بیماری های دیگر

دسته دارویی و مکانیسم اثر:

این دارو یک مقلد سمپاتیک است که گیرنده های آلفا-آدرنژیک در عروق ملتحمه بینی را تحریک می کند و موجب تنگی عروق این ناحیه و رفع احتقان می شود.

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار و مورد مصرف هر دارو را پزشک با توجه به شرایط هر بیمار تعیین میکند، اگرچه دوز عمومی مصرف به شرح ذیل می باشد:

جهت درمان احتقان بینی:

مصرف این دارو در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود.

افراد بالای ۱۲ سال: هر ۶ ساعت ۱ الی ۲ پاف در هر سوراخ بینی.

نحوه مصرف:

بینی خود را پیش از استفاده تمیز کنید.

زمانی که برای اولین بار از این دارو استفاده می کنید، باید ابتدا بطری را برای مصرف آماده نمایید. بدین منظور چند مرتبه دارو را در هوا اسپری کنید تا زمانی که مطمئن شوید دارو از اسپری به درستی خارج می شود.

جهت استفاده از اسپری باید در حالت ایستاده یا نشسته قرار بگیرید. نوک اسپری را داخل سوراخ بینی خود قرار داده، سر را کمی به جلو خم کنید. سوراخ دیگر بینی را با دست خود ببندید. همزمان با اسپری کردن دارو از طریق بینی نفس بکشید.

از اسپری کردن مستقیم دارو به دیواره داخل بینی، دهان و چشم خودداری نمایید.

بعد از هر مرتبه استفاده از اسپری آن را به وسیله دستمال کاغذی تمیز نمایید.

پس از استفاده، درپوش اسپری را بر روی آن قرار دهید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود حساسیت به نفازولین یا سایر اجزای تشکیل دهنده و یا ابتلا به گلوکوم زاویه بسته از مصرف فرآورده خودداری نمایید.

ATW.345/LF.01

شرکت داروسازی
خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک انتظام، خیابان شهید غلامرضا جال،
پنجاه و یکم، پلاک ۱۱۵
کدپستی: ۱۳۸۷۶۵۱۲ | تلفن: ۰۲۱-۲۳۵۲۳۱۴۰-۱۷
info@kharazmi-pharm.com | www.kharazmi-pharm.com