

Enteric Coated Capsule Doxycycline Hyclate 100

داکسی سایکلین هم چنین در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین، جهت درمان عفونت های ناشی از کلستریدیوم، اکتینومایکوزیس، لیستریا مونوسیتوز و سفلیس تجویز می گردد.

نحوه مصرف:

– به منظور کاهش ریسک بروز ازوفازیت(التهاب مری)، دارو را با حداقل یک لیوان آب و در حالت ایستاده یا نشسته مصرف نمایند. بعد از مصرف دارو حداقل به مدت یک ساعت از دراز کشیدن خودداری نمایند.

– شما می توانید به منظور کاهش عوارض گوارشی، این دارو را همراه با غذا مصرف نمایید.

– در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت از دارو، به محض به یاد آوردن، آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف این نوبت خودداری کنید و برنامه معمول دارویی خود را ادامه دهید و مقدار مصرف را دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هر یک از موارد زیر قبل از مصرف دارو، پزشک خود را مطلع سازید:

– سابقه حساسیت به داکسی سایکلین و یا سایر داروهای دسته دارویی تتراسایکلین ها

و نیز اجزای غیر دارویی این کپسول

– ابتلا به میاستنی گراویس

– مصرف همزمان داروی ایزوترتینوئین

– در نوزادان و کودکان با سن کمتر از ۸ سال

– بارداری و شیردهی

مصرف در بارداری و شیردهی:

– در صورتی که باردار هستید و یا قصد بارداری دارید، از مصرف این دارو خودداری نمایید.

– به علت ایجاد عوارض دائمی بر دندان های نوزاد، مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع می باشد.

موارد احتیاط:

در صورت وجود هر یک از موارد زیر پزشک خود را مطلع سازید:

– در طول درمان با این دارو، پوست شما نسبت به نور حساس تر می شود، لذا در زمان قرارگیری در معرض نور خورشید از ضد آفتاب استفاده نمایید و در صورت بروز قرمزی

و التهاب پوست پزشک خود را مطلع سازید.

– وجود اختلالات عملکرد کبدی یا کلیوی

کپسول اتریک کوتد داکسی سایکلین هایکلایت ۱۰۰

هر عدد کپسول اتریک کوتد داکسی سایکلین حاوی ۱۰۰ میلی گرم ماده موثره داکسی سایکلین (به صورت ملح هایکلایت) می باشد که در جبهه های حاوی ۳ پلیستر ۱۰ عددی، توسط شرکت داروسازی خوارزمی تولید و به بازار عرضه می شود.

راهنمای عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع رسانی نمایید.

• وجود هر گونه حساسیت به دارو

• استفاده از سایر داروها

• ابتلا به بیماری های دیگر

موارد و مقدار مصرف دارو:

داکسی سایکلین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف از دسته تتراسایکلین ها است که بر تعداد زیادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی اثر آنتیباتیک دارد. این دارو برای درمان بسیاری از بیماری های عفونی تجویز می شود.

مقدار مصرف این دارو را پزشک بر اساس نوع و شدت بیماری و پاسخ دهی شما به درمان تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو برای تعدادی از عفونت ها به شرح زیر می باشد:

– عفونت های تنفسی ناشی از مایکوپلاسما پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس نومونیا: روز اول ۲۰۰ میلی گرم سپس روزانه

۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم

– عفونت های قارچی: ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز، به مدت ۷ روز

– سیفلیس اولیه یا ثانویه: ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز، به مدت ۱۴ روز

– تب ناشی از گزش کنه یا شیش: تک دوز ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلی گرم

– عفونت های ادراری: ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز

– مراحل ابتدایی بیماری لایم: ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز، به مدت ۱۰ الی ۳۰ روز

– اسهال مسافریتی ناشی از اشریشیا کلی: روز اول ۲۰۰ میلی گرم سپس روزانه ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم

– وبا ناشی از ویبریو کلرا: ۳۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز

– مالاریا ناشی از پلاسمودیوم فالسیپاروم: روزانه ۲۰۰ میلی گرم برای حداقل ۷ روز

– پیش گیری از مالاریا: ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز، از ۲ روز قبل از سفر به مناطق مالاریا خیز و تا ۴ هفته بعد از بازگشت

– آکنه و لگاریس: ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز

– آمیبیاز روده ای حاد: روز اول ۲۰۰ میلی گرم سپس روزانه ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم

- سابقه حساسیت دارویی همراه با علائمی مانند تب، آنوزینوفیلی و تورم غدد لنفاوی که نشانه های سندرم درس (DRESS) هستند.
- افزایش فشار داخل جمجمه ای که با علائمی مانند سردرد و اختلالات بینایی همراه است.

- ابتلا به بیماری لوپوس اریتماتوز

- در صورت بروز اسهال شدید با همراه با خون در طی درمان و نیز بعد از اتمام دوره درمان با داکسی سایکلین. این علائم ممکن است کولیت سودومونوس باشد و پزشک شما تصمیم بگیرد دارو را قطع نماید.

تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی ممکن است نحوه عملکرد داروهای شما را تغییر دهد یا خطر عوارض جانبی جدی را افزایش دهد. لیست زیر شامل همه تداخلات دارویی احتمالی نیست. بهتر است لیستی از تمام محصولات که استفاده می کنید (از جمله داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) تهیه نمایید و آن را با پزشک و داروساز خود به اشتراک بگذارید. بدون تأیید پزشک، مصرف داروها را شروع یا متوقف نکنید و از تغییر میزان مصرف آنها خودداری کنید.

داروایی که با کپسول داکسی سایکلین تداخل دارند عبارتند از:

- ضد انعقاد های خوراکی مانند وارفارین. داکسی سایکلین فعالیت پروترومبین را کاهش می دهد بنابراین دوز داروهای ضدانعقاد ممکن است نیاز به کاهش داشته باشد.
- داروهای کاهش دهنده اسید معده حاوی کلسیم، منیزیم یا آلومینیوم باعث کاهش جذب داروی داکسی سایکلین می شوند و نباید همراه با این دارو تجویز شوند.
- داروها و مکمل های حاوی آهن، زینک و بیسموت باعث کاهش سطح سرمی داکسی سایکلین می شوند بنابراین باید با حداقل فاصله زمانی ممکن از داکسی سایکلین تجویز شوند.

- داکسی سایکلین ممکن است باعث کاهش اثر داروهای ضدبارداری خوراکی شود و توصیه می شود در صورت مصرف این داروها در طول درمان با داکسی سایکلین، از روش پیش گیری دیگری نیز استفاده شود.

- از تجویز همزمان داکسی سایکلین و داروی متوکسی فلوران باید اجتناب شود. تجویز همزمان ممکن است منجر به سمیت کلیوی و مرگ گردد.

- از تجویز همزمان ایزوتریتینوئین و داکسی سایکلین به علت افزایش فشار داخل جمجمه خودداری شود.

- کاربامازپین، فنی توتین و باریتورات ها باعث کاهش سطح سرمی و نیمه عمر داکسی سایکلین می شوند.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز برخی عوارض

ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز هر یک از علائم زیر فوراً به پزشک خود مراجعه نمایید.

- احساس تنگی نفس، مشکل در تنفس، تب، تورم لب ها، پلک چشم و صورت، خارش و بیثورات پوستی

- درد شکمی، بی اشتها، اسهال شدید یا خونی که ممکن است نشان دهنده کولیت سودومونوس باشد. (این مورد ممکن است دو الی سه ماه بعد از قطع دارو رخ دهد و ممکن است با تب همراه باشد)

در صورت بروز هر یک از علائم زیر در اولین فرصت پزشک خود را مطلع سازید.

- بروز علائم پوستی ناشی از افزایش حساسیت به نور مانند راش پوستی، خارش، قرمزی، آفتاب سوختگی شدید

- تب و تورم غدد لنفاوی

- سردرد و اختلالات بینایی

- تغییر در تعداد سلول های خونی و ایجاد عوارضی از جمله آنمی همولیتیک،

نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، آنوزینوفیل

- درد های عضلانی و مفصلی

- افزایش ضربان قلب، افت فشار خون

سایر عوارض این دارو که معمولاً به ادامه مصرف دارو از بین می روند عبارتند از:

- سوزش معده، سردرد، احساس وز وز داخل گوش، قرمز شدن پوست (فلاشینگ)، تغییر در تست های عملکرد کبدی، افزایش اوره خون، جدا شدن ناخن ها از بسترشان، تغییر رنگ دندان ها

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را از بسته بندی اصلی خارج نکنید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هیچ فرآورده یا دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. در مورد نحوه امحاء آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادی به حفاظت از محیط زیست می نمایند.

**ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران - ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی: شهریور ۱۴۰۵**

شرکت داروسازی
خوارزمی

آدرس: تهران، شهرک استقلال، خیابان شهید غلامرضا جلال،
پنجمین پست دارویی خوارزمی، پلاک ۱۵
کد پستی: ۱۷۸۲۵۹۱۲ | تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۴۱۲-۱۷
info@kharazmipharm.com | www.kharazmipharm.com